



AZRO[®] 500

Azithromycine 500 mg

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

Composition :

Azithromycine 500 mg.
(sous forme d'azithromycine dihydraté).

Excipients : croscarmellose, cellulose microcristalline, lauryl sulfate de sodium, povidone, stéarate de magnésium, hydroxypropylcellulose, lactose monohydraté, talc, dioxyde de titane, parahydroxybenzoate de méthyle, polyéthylène glycol 6000 q.s.p un comprimé.

Forme pharmaceutique :

Boîte de 3 comprimés pelliculés sécables.

Classe pharmaco- thérapeutique :

ANTIBIOTIQUE ANTI-BACTERIEN de la famille des macrolides.

(J : anti-infectieux)

2/ DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes à germes sensibles :

- Angines, bronchites aiguës et surinfection des bronchites chroniques.
- Infections stomatologiques.

3/ ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications

- Allergie connue à ce médicament ou à tout autre macrolide.
- Certaines associations médicamenteuses (voir interactions médicamenteuses).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Prévenez votre médecin en cas de :

- Insuffisance rénale.
- Insuffisance hépatique sévère.
- Grossesse et allaitement.

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en association avec la bromocriptine, la cabergoline et la pergolide

MISES EN GARDE SPECIALES :

Avant de prendre ce traitement, prévenez votre médecin si l'occasion d'un traitement antibiotique antérieur, vous avez présenté des manifestations d'origine allergique.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Ce médicament est contre-indiqué en cas d'association avec les alcaloïdes de l'ergot de seigle ergotamine et dihydroergotamine (médicament anti-migraineux) et le cisapride (médicament anti-reflux)

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

L'innocuité de l'azithromycine chez la femme enceinte ou allaitement n'ayant pas été établie, la prescription ne sera effectuée que si les bénéfices attendus apparaissent supérieurs aux risques encourus.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

4/ COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie :

La posologie usuelle est chez l'adulte :

- Pour le traitement de certaines angines et des infections bucco-dentaires : 500 mg (1 comprimé) par jour pendant 3 jours.





- Pour le traitement des bronchites : 500 mg (1 comprimé) le 1er jour, puis 250 mg (1/2 comprimé) par jour pendant les 4 jours suivants.
- Pas de modification de posologie chez le sujet âgé.
- Même posologie chez les patients avec une insuffisance hépatique moyenne à modérée.
- **DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.**

Voie et mode d'administration

Voie orale

Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau, pendant ou en dehors des repas, en une seule prise par jour.

Durée du traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé. La disparition de la fièvre ou de tout autre symptôme ne signifie pas que vous êtes complètement guéri. L'éventuelle impression de fatigue n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

Consulter immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

5/ EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS:

L'azithromycine est généralement bien tolérée avec une faible incidence d'effets secondaires. La plupart de ces effets sont légers à modérés :

- Effets cutané-muqueux et allergiques : éruptions cutanées, photosensibilité, douleurs au niveau des articulations, rarement œdème de Quincke, réaction allergique généralisée.
- Effets gastro-intestinaux : diarrhées, selles molles, douleurs ou crampes abdominales, nausées, vomissement, flatulences.
- Effets hépatiques : augmentation des transaminases (enzymes du foie) réversibles à l'arrêt du traitement, de rares atteintes hépatiques.
- Effets neurologiques : sensations vertigineuses, rares cas de convulsions.
- Effets auditifs : rares cas de troubles de l'audition avec sifflements, bourdonnements ou surdité.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6/ CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

7/ Présentation :

AMM N° : 925322 1

CECI EST MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**
Cheylus 1111 - Zaghovan

AP026/08

