



**COMPRIMÉS  
ENROBÉS**

## **1-IDENTIFICATION DU MEDICAMENT**

### **Dénomination:**

TANAKAN 40 mg, comprimés enrobés

### **Composition qualitative :**

Extrait de Ginkgo biloba standardisé (EGb 761) titré à 24% d'hétérosides de Ginkgo et 6% de Ginkgolides-bilobalide. Lactose monohydraté, Cellulose microcristalline, Amidon de maïs, Silice colloïdale anhydre, Talc, Stéarate de magnésium, Opadry. OY-S-35002

### **Composition quantitative :**

Extrait de Ginkgo biloba standardisé (EGb 761) titré à 24% d'hétérosides de Ginkgo et 6% de Ginkgolides-bilobalide : 40 mg par comprimé

### **Forme pharmaceutique :**

Comprimé enrobé, boîte de 30 et boîte de 90

### **Classe pharmaco-thérapeutique :**

Vasodilatateur périphérique (C : système cardiovasculaire)

## **2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

### **Indications thérapeutiques :**

Ce médicament est indiqué dans ;

- le traitement des troubles neurologiques mineurs liés au vieillissement
- le traitement des symptômes de l'artérite des membres inférieurs (maladie des artères des jambes entraînant des crampes douloureuses à la marche)
- les troubles visuels et autres troubles (auditifs ou vertige) d'origine circulatoire
- la maladie de Raynaud

### **ATTENTION !**

## **3- DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

### **Contre-indications :**

TANAKAN est contre indiqué chez les malades hypersensibles à l'un des constituants du comprimé  
**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### **Mise en gardes spéciales**

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du déficit en lactase (maladies métaboliques rares)

### **Précautions d'emploi :**

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**





## Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions :

*AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.*

## Grossesse et Allaitement :

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament

**LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :** Lactose monohydraté

## 4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Posologie

3 comprimés par jour, à répartir dans la journée

*CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE OU PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE*

- IL NE PEUT PAS ÊTRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

## Mode et Voie d'administration :

Voie orale.

Les comprimés sont à prendre avec un demi-verre d'eau au moment des repas

## Durée du traitement :

Se conformer à l'avis de votre médecin

## 5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

*COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :* rarement troubles digestifs, troubles cutanés, maux de tête

*SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENEANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.*

## 6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

## 7- PRESENTATION

Bte de 30 - AMM N° : ST914 301 2

Bte de 90 - AMM N° : 925 350 1

### CECI EST MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

**TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS**



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**  
Sous licence **BEAUFOR IPSEN Pharma**  
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

**BEAUFOR IPSEN**  
Pharma

AP007/06

