

Si vous avez pris plus de TEROS que vous n'auriez dû :

Prévenez votre médecin.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### 5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

##### Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Effets indésirables les plus fréquents sont : maux de tête et indigestions.
- Effets indésirables moins fréquemment rapportés sont : douleurs dorsales, douleurs musculaires, congestions nasales, bouffées vasomotrices et sensations vertigineuses.
- Effets indésirables peu fréquents sont : œdèmes des paupières, douleurs oculaires et yeux rouges.

Si vous présentez l'un de ces effets indésirables, et s'ils sont gênants, sévères, ou s'ils ne s'estompent pas, prévenez votre médecin.

- Des réactions allergiques (y compris des éruptions cutanées, gonflement du visage et urticaire) peuvent survenir.
- Dans de rares cas, des érections prolongées et parfois douloureuses peuvent survenir après la prise de ce médicament. Si vous avez une telle érection qui persiste de manière continue pendant plus de 4 heures, vous devez contacter immédiatement un médecin.
- En cas de douleur thoracique survenant pendant ou après une activité sexuelle, vous NE devez PAS utiliser de dérivés nitrés, mais vous devez contacter immédiatement votre médecin.

- De rares cas de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, d'irrégularité du rythme cardiaque, de sensation de palpitations et de pression artérielle élevée ou basse ont été rapportés chez des hommes prenant ce médicament.

- Une perte ou une diminution de la vision, partielle, soudaine, temporaire ou permanente, d'un ou des deux yeux a été rapportée.

- Une vision trouble, des évanouissements, une augmentation de la sudation, une migraine et des saignements du nez ont été rarement rapportés.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

#### 6- CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

Précautions particulières de conservation

A conserver à une température inférieure à 30 °C

##### CECI EST MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**  
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

# TEROS<sup>20mg</sup>

Tadalafil

Comprimés pelliculés

***Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice car elle contient des informations importantes pour vous***

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

#### 1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

##### Composition

Tadalafil ..... 20 mg

**Excipients** : lactose monohydraté, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hydroxypropylcellulose faiblement substituée, laurylsulfate de sodium, stéarate de magnésium, hypromellose, talc, dioxyde de titane, oxyde de fer jaune, triacétine q.s.p un comprimé pelliculé

##### Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé, Boîte de 4 et boîte de 8.

##### Classe pharmacothérapeutique

INHIBITEUR DE LA PHOSPHODIESTERASE DE TYPE 5 : Médicament utilisé dans la dysfonction érectile.



## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est un traitement pour les hommes souffrant de dysfonction érectile; c'est-à-dire quand un homme ne peut atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle.

Il est important de savoir que TEROS n'agit pas s'il n'y a pas de stimulation sexuelle

### 3- ATTENTION !

#### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

##### Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE :

- si vous prenez des dérivés nitrés ou des donneurs de monoxyde d'azote comme le nitrite d'amyle sous quelque forme que se soit. Ce groupe de médicaments ("les dérivés nitrés") est utilisé dans le traitement des crises d'angine de poitrine ("douleurs thoraciques"). Il a été montré que ce médicament augmentait les effets de ces médicaments. Si vous prenez des dérivés nitrés sous n'importe quelle forme ou si vous avez des doutes, prévenez votre médecin.
- si vous avez une maladie cardiaque grave ou avez récemment eu une crise cardiaque.
- si vous avez récemment eu un accident vasculaire cérébral.
- si vous souffrez d'hypotension artérielle ou d'hypertension artérielle non contrôlée.
- si vous êtes allergique (hypersensible) au tadalafil ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament.
- si vous avez déjà présenté une perte de la vision due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artérielle (NOIAN).
- en même temps que d'autres traitements de la dysfonction érectile
- ce médicament n'est pas indiqué chez les femmes ou chez les patients de moins de 18 ans.

L'utilisation de Tadalafil n'est pas recommandée pour les patients présentant une insuffisance hépatique grave.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

L'activité sexuelle comporte un risque potentiel chez les patients ayant une pathologie cardiaque, en raison du surcroît d'effort entraîné au niveau du cœur. Si vous avez un problème cardiaque, parlez-en à votre médecin.

Ce médicament peut également ne pas vous être indiqué pour les raisons qui suivent. Si vous êtes concerné par l'une d'entre elles, parlez-en à votre médecin avant de prendre ce médicament :

- vous souffrez de drépanocytose (malformation des globules rouges), de myélome multiple (cancer de la moelle osseuse), de leucémie (cancer des cellules sanguines) ou d'une déformation du pénis,
- Chez les patients souffrant de problèmes hépatiques graves ou d'insuffisance rénale légère ne devraient pas prendre plus de 10 mg en une seule dose.

En cas de diminution ou de perte soudaine de la vision, vous devez arrêter votre traitement et contacter immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare)

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

D'une manière générale, indiquez toujours à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance, car ils pourraient interagir.

Ceci est particulièrement important si vous suivez un traitement à base de dérivés nitrés, car vous ne devez pas prendre TEROS si vous prenez ces médicaments.

Informez votre médecin si vous êtes traité par un alpha-bloquant, un médicament utilisé parfois pour traiter l'hypertension artérielle et l'hypertrophie de la prostate.

Informez également votre médecin si vous êtes traité pour l'une de ces maladies.

Ne prenez pas ce médicament en même temps que d'autres médicaments si votre médecin vous dit que vous ne devez pas le faire.

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS,**

**II FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.**

**LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :** Lactose

## CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Les patients amenés à conduire des véhicules ou à utiliser des machines doivent être attentifs à la survenue possible de vertiges

## 4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose recommandée est d'un comprimé à 10 mg à prendre avant l'activité sexuelle. Si l'effet de cette dose est trop faible, votre médecin pourra augmenter la dose à 20 mg.

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.**

### Voie et mode d'administration

Voie orale.

Avalez le comprimé en entier avec un peu d'eau. Vous pouvez prendre ce médicament avec ou sans prise de nourriture.

Vous pouvez prendre un comprimé de TEROS au moins 30 minutes avant l'activité sexuelle. TEROS peut rester efficace jusqu'à 36 heures après la prise du comprimé. Il est important de savoir que TEROS n'agit pas s'il n'y a pas de stimulation sexuelle. Vous et votre partenaire devrez engager les préliminaires comme vous le feriez si vous ne preniez pas de médicament pour les troubles de l'érection.

La prise d'alcool peut affecter votre capacité à obtenir une érection.

Évitez de boire de l'alcool de façon excessive, ceci pouvant augmenter le risque de sensation de vertiges lors du passage à la position debout.

Vous ne devez PAS prendre ce médicament plus d'une fois par jour.

La prise de ce médicament se fait avant toute activité sexuelle.

L'utilisation quotidienne prolongée est déconseillée