



# Cipractine 4 mg

## Cyproheptadine chlorhydrate

### 1-IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

#### Composition :

Chlorhydrate de cyproheptadine..... 4.00 mg.

Excipients : lactose modifié, hydrogénophosphate de calcium anhydre, amidon prégelatinisé, stéarate de magnésium q.s.p un comprimé.

#### Forme pharmaceutique :

Comprimés sécable, boîte de 30.

#### Propriétés pharmacologiques :

CIPRACTINE est un antagoniste de la sérotonine et de l'histamine possédant des propriétés anticholinergiques et sédatives.

Aux doses recommandées, CIPRACTINE stimule l'appétit chez l'adulte et l'enfant.

### 2/ DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

#### Indications thérapeutiques

-Stimulation de l'appétit chez les malades présentant une diminution de l'appétit accompagnée d'une perte de poids.

-Traitement symptomatique des manifestations allergiques (aigües ou chroniques) et des affections dermatologiques prurigineuses (rhinites, conjonctivite, urticaire).

-Migraine : CIPRACTINE a un effet bénéfique chez les patients souffrant de migraine.

### 3/ ATTENTION !

#### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

##### Contre-indications

- Agranulocytose ancienne ou récente
- Certaines formes de glaucome
- Difficulté pour uriner d'origine prostatique ou autre
- Allergie connue aux antihistaminiques
- Grossesse et allaitement

*EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Possibilité d'étourdissement, de sédation et d'hypertension chez les patients âgés.

- Chez les jeunes enfants, les effets sont inversés, les antihistaminiques peuvent provoquer des phénomènes d'excitation.

-Précaution à prendre chez les malades atteints de maladies cardiovasculaires

*EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.*

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRE INTERACTIONS

**AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

- Les IMAO intensifient les effets anticholinergiques des antihistaminiques.

- L'absorption de boissons alcoolisées ou d'autres déprimeurs du système nerveux central pendant le traitement est déconseillé.

Ce médicament contient un antihistaminique, la cyproheptadine  
D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser  
la dose maximale recommandée (cf. chapitre posologie).

#### GROSSESSE – ALLAITEMENT :

##### Grossesse :

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin : Lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

##### Allaitement :

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, la prise de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.





## CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

L'attention est appelée, notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs des machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament, surtout en début de traitement.

Ce phénomène est accentué par la prise de boissons alcoolisées ou de médicaments contenant de l'alcool.

**LISTE DES EXCIPIENT A EFFET NOTOIRE :** Lactose

## 4/COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Posologie :

Adultes et enfants de plus de 6 ans

\*Stimulation de l'appétit : la dose journalière peut être administrée en une seule prise le soir ou en plusieurs prises.

- Adultes : 3 comprimés par jour.

- Enfants : 7 à 14 ans : la dose quotidienne ne doit pas dépasser 3 comprimés par jour.

\*Antiallergiques et antiprurigineux :

- Adultes : 1 comprimé, 3 ou 4 fois par jour. Ne pas dépasser 8 comprimés par jour.

- Enfants : 7 à 14 ans : 1 comprimé, 3 fois par jour. Ne pas dépasser 4 comprimés par jour.

\*Traitement prophylactique ou thérapeutique de la migraine : Dose initiale : 1 comprimé répété au bout d'une demi-heure. Ne pas dépasser 2 comprimés dans une période de 4 à 6 heures. La dose de maintien est de 1 comprimé toutes les 4 à 6 heures.

**Mode et voie d'administration :** Voie orale

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

### Fréquence et moment d'administration :

Il est préférable de commencer le traitement le soir.

Les prises seront espacées d'environ 8 heures.

### Durée du traitement :

Le traitement doit être court (quelques jours).

## 5/EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

### Effets indésirables :

**COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT ENTRAINER, CHEZ CERTAINES PERSONNES DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :**

- Tractus gastro-intestinal : anorexie, nausées, vomissement, douleurs abdominales, diarrhée.

- Système hématopoïétique : leucopénie, thrombocytopénie, anémie.

- Ouïe : bourdonnement d'oreilles, perte de l'acuité auditive.

- Système nerveux : vertige, crises convulsives.

- Foie : fibrose hépatique.

- Cœur : trouble du rythme cardiaque.

Autres effets : photosensibilité, faiblesse, frisson, sécheresse buccale, hyper uricémie, réactions anaphylactiques (fièvre d'origine allergique, oedème facial .....), dépôt métallique au niveau des gencives.

**SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

## 6/CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A conserver à une température inférieure à 25 °C.

AMM N° : 925 324 1

### CECI EST MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS**



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**  
Cheylus 1111 - Zaghouan

AP037/03