

daflon® 500 mg

Comprimé pelliculé

Fraction flavonoïque purifiée micronisée

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que DAFLON 500 mg comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : VASCULOPROTECTEURS / MÉDICAMENTS AGISSANT SUR LES CAPILLAIRES / BIOFLAVONOÏDES (C05CA53 : système cardiovasculaire)

Ce médicament est un veinotonique (il augmente le tonus des veines) et un vasculoprotecteur (il augmente la résistance des petits vaisseaux sanguins).

Il est préconisé dans le traitement des troubles de la circulation veineuse (jambes lourdes, douleurs, impatiences du primo-décubitus) et dans le traitement des signes fonctionnels liés à la crise hémorroïdaire

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

Ne prenez jamais DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la fraction flavonoïque purifiée micronisée ou à l'un des autres composants.

Faites attention avec DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé :

Crise hémorroïdaire :

Si les troubles hémorroïdaires ne cèdent pas en 15 jours, il est indispensable de consulter votre médecin.

Troubles de la circulation veineuse :

Ce traitement a toute son efficacité lorsqu'il est associé à une bonne hygiène de vie.

• Éviter l'exposition au soleil, la chaleur, la station debout prolongée, l'excès de poids.

• La marche à pied et éventuellement le port de bas adaptés favorisent la circulation sanguine

Prise ou utilisation d'autres médicaments :

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Grossesse

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant votre traitement, ou si vous êtes enceinte et envisagez de prendre ce médicament, consultez votre médecin.

Allaitement

En l'absence de données sur le passage dans le lait maternel, l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament

3. COMMENT PRENDRE DAFLON 500mg, comprimé pelliculé ?

Posologie

Insuffisance veineuse : 2 comprimés par jour, soit un comprimé à midi et un comprimé le soir au moment des repas.

Crise hémorroïdaire : la posologie est de 6 comprimés par jour pendant 4 jours, puis 4 comprimés par jour les 3 jours suivants au moment des repas.

Si vous avez pris plus de DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé que vous n'auriez dû :

Un surdosage risque de causer une aggravation des effets indésirables.

Si vous avez pris plus de DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé qu'il ne fallait, veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

La fréquence des effets indésirables possibles listés ci-dessous est définie en utilisant le système suivant :

- très fréquent (affecte plus de 1 utilisateur sur 10)
- fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 100)
- peu fréquent (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 1 000)
- rare (affecte 1 à 10 utilisateurs sur 10 000)
- très rare (affecte moins de 1 utilisateur sur 10 000)
- fréquence inconnue (les données disponibles ne permettent pas d'estimer la fréquence)

Ils peuvent inclure :

Fréquent : diarrhée, dyspepsie, nausée, vomissement.

Peu fréquent : colite.

Rare : sensations vertigineuses, céphalées, malaise, rash, prurit, urticaire.

Fréquence inconnue : douleur abdominale, œdème isolé du visage, des paupières, des lèvres. Exceptionnellement, œdème de Quincke.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration.

5. COMMENT CONSERVER DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de conditions particulières de conservation.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé ?

Les substances actives sont :

Fraction flavonoïque purifiée micronisée 500,000 mg

Correspondant à :

Diosmine 90 pour cent 450,000 mg

Flavonoïdes exprimés en hespéridine 10 pour cent 50,000 mg

Humidité moyenne 20,000 mg

Pour un comprimé pelliculé

Les autres composants sont :

Carboxyméthylamidon sodique, cellulose microstalline, gélatine, stéarate de magnésium, talc,

Pelliculage : dioxyde de titane (E 171), glycérol, laurylsulfate de sodium, macrogol 6000, hypromellose, oxyde de fer jaune (E 172), oxyde de fer rouge (E 172), stéarate de magnésium.

Qu'est ce que DAFLON 500 mg, comprimé pelliculé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé pelliculé.

Boîtes de 30 comprimés pelliculés.

AMM N° 925 398 1

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 21 juillet 2016

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires TERIAK
Cheylus 1111 - Zaghouan

Sous licence des Laboratoires SERVIER



AP185/01

CONSEILS EDUCATION SANITAIRE

Troubles de la circulation

- 1 Evitez de rester assis ou debout trop longtemps, surélevez légèrement les pieds de votre lit.
- 2 Evitez l'exposition au soleil et à la chaleur
- 3 Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée et à pratiquer une activité physique régulière (marche à pied, vélo...), évitez l'excès de poids.
- 4 Evitez les vêtements trop serrés, le port de chaussettes ou de bas de contention ainsi que doucher ses jambes avec de l'eau froide favorisent la circulation sanguine.



Hémorroïdes

- 1 Buvez 1,5 à 2L d'eau par jour, consommez des aliments à forte teneur en fibres afin d'éviter la constipation (fruits, légumes verts, céréales complètes), évitez les graisses, le café, l'alcool et les aliments épicés.
- 2 Faites de l'exercice régulièrement pour stimuler le flux sanguin, évitez de porter des objets trop lourds.



إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكن ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا لتعليمات عرضك للخطر.
- اتبع بدقة وصفة الطبيب وطريقة الإستعمال المخصوص عليها وتعليمات الصيدلاني الذي صرفها لك.
- أتبع نصائح الصيدلاني.
- طالعيب والصيدلاني هما الجهران بالدواء وينبغهم وضروه.
- لا تلطع مده العلاج المحدث لك من قضاء نفسك.
- لا تدم ولا تزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية في متناول أيدي الأطفال

AP185/01



تصنيع مخابر ترياق
شيلوس 1111 زغوان
بترخيص من مخابر سرهبيه



3- كيف تتناول دافلون 500 مع قرصا مليسا

الجرعة
قصور وريدي: قرصين في اليوم، قرص واحد مع منتصف النهار وواحد في المساء أثناء الأكل.

النوبة الياسورية: 6 أقراص في اليوم لمدة أربعة أيام ثم 4 أقراص في اليوم لمدة ثلاثة أيام الموالية أثناء الأكل.

في حال تناول أكثر مما يجب من دافلون 500 مع

إن علامات تناول جرعة زائدة تجر عليها زيادة في الآثار الجانبية. إذا أخذت أكثر من دافلون 500 مع مما يجب فعليك بمراجعة الطبيب أو الصيدلاني.

4- الآثار الجانبية الغير مرغوبة

كما هو الحال مع كافة الأدوية، فقد تنتج عن دافلون 500 مع قرصا مليسا آثار غير مرغوبة رغم أنها لا تخص الجميع منها :

تواتر الآثار الجانبية المحتملة المدرجة أدناه يتم تعريفها باستخدام النظام التالي:

- شائع جدا: يؤثر على 1 من 10 مستعملين
- شائع: يؤثر على 1 من 100 مستعملين
- إستثنائي: يؤثر على 1 من 1000 مستعمل
- نادر: يؤثر 1 إلى 10 من 10000 مستعمل

- نادر جدا: يؤثر على أقل من 1 على 10000 مستعمل
غير معروفة: عدم توفر أية معطيات تشير إلى نسبة تلك الاحتمالات

التغيرات التي قد تحصل:

شائع: إسهال، سوء الهضم، غثيان، قيء
إستثنائي: التهاب القولون

نادر: شعور بالدوران، صداع، شعور بالضيق، الطضع الجلدي، الحكمة، الإحمرار السرى

الغير معروفة: آلام في البطن، تورم الوجه، الجفنين، الشفتين، بصورة استثنائية تورم Quinke.

الإبلاغ عن الآثار الجانبية

إذا أحسست بأي آثار جانبية، إعلم طبيبك أو الصيدلاني. وهذا ينطبق أيضا على أي آثار جانبية لم يرد ذكرها في هذه النشرة.

يمكنك أيضا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرة عن طريق نظام الإبلاغ الوطني.

5- كيفية حفظ دافلون 500 مع قرصا مليسا

لا تدع الدواء في متناول أيدي الأطفال ولا تحت أنظارهم.
لا يجوز إستعمال هذا الدواء بعد تاريخ إنتهاء الصلوحية المذكورة على العبوة. يشير تاريخ إنتهاء الصلاحية إلى آخر يوم من هذا الشهر.

لا توجد احتياطات خاصة للحفظ.
لا يجوز رمي الأدوية في المجاري أو مع النفايات المنزلية.

إستعمل لدى الصيدلاني عن وسيلة للتخلص من الأدوية الغير المستعملة، فإن هذه الاحتياطات تساهم في حماية البيئة.

6- معلومات إضافية

على ما يحتوي دافلون 500 مع قرصا مليسا

المادة الفعالة هي،
جزء فلافوني منقى ومحول إلى مسحوق مستعلق 500 مع
كمية كافية ل:

ديوسمين 90% 450 مع
فلافونيد مقدره بكمية الهيستيردين 10% 50 مع
رطوبة متوسطة 20 مع

كمية كافية لقرص مليس

سواغات: كاركسيميثيلاميدون صوديوم، سليلوز الميكروكريستالين، الجيلاتين، ستيرات الماننوزيوم، تالك، فيلرسول، هيبروميكلوز، ميكروفول 6000

لوريولونات السوديوم، أكسيد الحديد الأصفر (E172) أو أكسيد الحديد الأحمر (E172)، ثاني أكسيد التيتاني (E171).

ما هو دافلون 500 مع قرصا مليسا ومحتوى الغلاف الخارجي

هذا الدواء هو في شكل أقراص مليسة
علية من 30 قرصا مليسا

رقم التسجيل: 1 925 398
تاريخ مراجعة النشرة الداخلية: 21 جويلية 2016

دافلون® 500 مع

قرصا مليسا

جزء فلافوني منقى ومحول إلى مسحوق مستعلق

اقرأ بدقة كامل النشرة قبل أخذ الدواء لأنه يحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

- إذا كانت لديك أسئلة أخرى أو شكوك، الرجاء استشارة طبيبك أو الصيدلاني.
- الرجاء حفظ هذه النشرة فقد تحتاج إلى قراءتها مجددا
- إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات والنصائح، راجع الصيدلاني
- إذا تعاقمت الأعراض أو استمرت، راجع الطبيب
- إذا أحسست بأي آثار جانبية لم يرد ذكرها في هذه النشرة، أو إذا كنت تشعر بأي من الآثار المذكورة بأنها خطيرة، أخبر طبيبك أو الصيدلاني.

مضمون هذه النشرة :

1. ما هو دافلون 500 مع قرصا مليسا ولماذا يستعمل
2. ماهي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أن تتناول دافلون 500 مع قرصا مليسا
3. كيف تتناول دافلون 500 مع قرصا مليسا
4. الآثار الجانبية المحتملة
5. كيفية حفظ دافلون 500 مع قرصا مليسا
6. معلومات إضافية

1- ما هو دافلون 500 مع قرصا مليسا ولماذا يستعمل ؟

فئة فارماكو تيرابيوتيك
فاسكولوبروتكتور / أدوية تعمل على كايلايرز / بيوفلافونويدس (C05CA53):
نظام القلب والأوعية الدموية)
هذا الدواء يمكن من مضاعفة نسبة الطاقة في الأوردة ومن رفع مستوى التصدي لدى الأوعية الدموية الصغيرة.
يؤسس به في علاج اضطرابات الدورة الدموية في الأوردة (ثقل على مستوى الأرجل، آلام، نفاذ الصبر من بريمو-ديكويبتوس) وفي علاج علامات وظيفية تتعلق بالأزمة الباسورية.

2- ماهي المعلومات التي ينبغي معرفتها قبل أخذ دافلون 500 مع قرصا مليسا ؟

لا تتناول أبدا دافلون 500 مع قرصا مليسا :

إذا كنت مصاب بالحساسية (شديد الحساسية) من جزء فلافوني منقى ومحول إلى مسحوق أو من أحد المركبات الموجود في هذا الدواء

ينبغي الحذر من دافلون 500 مع قرصا مليسا ؛

الأزمة الباسورية :

إذا كانت اضطرابات البواسير لا تتراجع في 15 يوما، فمن الضروري إستشارة الطبيب.

اضطرابات الدورة الدموية في الأوردة :

- هذا العلاج يمنع كل فعاليته عندما يرتبط مع نظام صحي سليم.
- تجنب التعرض لأشعة الشمس والحرارة والوقوف لفترات طويلة والوزن الزائد
- المشي وارتداء جوارب مناسبة يساعدان على تحسين الدورة الدموية.

التفاعلات الدوائية وتفاعلات أخرى

إذا كنت تتناول أو إذا كنت قد تناولت مؤخرا دواء آخر بما فيها الأدوية المضغوطة دون وصفة طبية، إعلم طبيبك أو الصيدلاني.

الحمل

إذا اكتشفتي أنك حامل خلال فترة العلاج أو إذا كنت حامل ونويتي أخذ هذا الدواء، استشيري طبيبك.

الإرضاع

في ظل غياب معطيات حول إمكانية مرور الدواء في حليب الأم، ينصح بعدم الإرضاع خلال فترة تناول الدواء.

استشيري طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء