



GLUFIX®

Acarbose 50 mg / 100 mg

Comprimé

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.

Si les symptômes s'aggravent ou persistent, consultez votre médecin.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Acarbose.....50/100 mg

Excipients communs: silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, amidon de maïs pré-gélatinisé, cellulose microcristallineq.s.p un comprimé

Forme pharmaceutique

Glufix 50 mg comprimé, boîte de 90

Glufix 100 mg comprimé, Boîte de 90

Classe pharmacothérapeutique

INHIBITEUR DE L'ALPHA-GLUCOSIDASE.

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est réservé aux adultes à partir de 18 ans en cas de :

- Traitement du diabète non insulino-dépendant, en complément du régime alimentaire, en monothérapie comme en association aux autres thérapeutiques antidiabétiques.

3- ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications

Ce médicament **NE DOIT PAS ETRE UTILISE** en cas :

• allergie à l'acarbose ou à l'un des composants,

• insuffisance rénale sévère,

• Insuffisance hépatique sévère

• problèmes digestifs majeurs.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTION D'EMPLOI

Faites attention lors de la prise de ce médicament et dans les cas suivants :

Suivre rigoureusement le régime prescrit par votre médecin.

Dans certains cas et particulièrement en cas d'insuffisance hépatique, votre médecin vous prescrira un examen biologique (dosage des enzymes hépatiques).

En cas d'hypoglycémie lors d'un traitement sous Glufix, il est recommandé d'absorber une boisson sucrée, ou à défaut plusieurs morceaux de sucre.

Prévenir votre médecin si vous avez été opéré de l'abdomen.

En raison de l'augmentation de la fermentation des hydrates de carbone dans le côlon au cours d'un traitement par Glufix, des troubles digestifs peuvent survenir. Ils peuvent s'améliorer avec le temps; l'étalement progressif de la posologie jusqu'à la dose souhaitée permet de prévenir ou de diminuer cette symptomatologie.

GLUFIX n'est pas recommandé pour les enfants et les adolescents âgés de moins de 18 ans.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Si vous prenez un autre traitement antidiabétique en même temps que Glufix, votre taux de sucre dans le sang après le repas pourrait être diminué de façon plus importante. Une adaptation de la posologie du traitement associé peut être nécessaire.

Si vous prenez de la digoxine en même temps que Glufix, la mise à disposition du médicament dans votre organisme peut être modifiée et une adaptation de la posologie de la digoxine peut être nécessaire.

L'administration simultanée de la colestyramine, d'absorbants intestinaux ou de médicaments à base d'enzymes digestives doit être évitée (modification possible de l'activité de Glufix).

Si vous prenez de la néomycine orale en même temps que Glufix, votre taux de sucre dans le sang après le repas pourrait être diminué de façon plus importante et la fréquence ou la sévérité des troubles digestifs pourrait augmenter.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE





GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

En cas de grossesse, prévenir votre médecin traitant qui se chargera d'adapter votre traitement hypoglycémiant.

Durant une grossesse, un diabète doit nécessairement être traité par de l'insuline

Il est recommandé d'arrêter Glulif si vous êtes enceinte.

Allaitement

Ce médicament n'est pas recommandé en période d'allaitement.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

La posologie initiale recommandée est de 1 comprimé à 50 mg 3 fois par jour.

En fonction de l'effet observé sur les paramètres glycémiques, la posologie pourra être portée à 100 mg 3 fois par jour.

- soit 1 comprimé de 100 mg 3 fois par jour

- ou 2 comprimés de 50 mg 3 fois par jour

La posologie pourra être adaptée à chaque patient en fonction de la tolérance et de l'effet observé sur les paramètres glycémiques.

Dans quelques rares cas, la posologie pourra être augmentée jusqu'à 200 mg, 3 fois par jour

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN

Voie d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau au début des repas ou croqués avec les premières bouchées.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de comprimés que vous n'auriez dû, contacter votre médecin qui procédera à un traitement symptomatique des troubles digestifs (diarrhée). Eviter l'absorption de boissons et/ou d'aliments sucrés pendant les 4 à 6 heures suivant le surdosage.

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Troubles digestifs:

• très fréquent : gaz (flatulences)

• fréquents : diarrhées, douleurs au ventre

• peu fréquents : nausées, vomissements, digestion difficile

Ces symptômes dépendent de la posologie et du régime alimentaire. Ces effets diminuent généralement au cours du traitement. Ils diminuent également lorsque le régime hypoglycémique prescrit est respecté. Si les symptômes persistent, la posologie devra être temporairement ou définitivement réduite.

- Réactions hépatiques: augmentations des enzymes du foie, jaunisses, réversibles à l'arrêt du traitement.

- Affections cutanées : éruptions, urticaires ou apparition de pustules

- Autres effets indésirables : thrombocytopénie, rarement: oedème

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6- CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C, à l'abri de l'humidité

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS

AP205/00



Fabriqué par les Laboratoires **TERRIAK**
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

