

DOLVEN[®] 200 mg

Ibuprofène

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes sur votre traitement

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire

1/ IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Ibuprofène 200,00 mg

Excipients : Cellulose microcristalline, stéarate de magnésium q.s.p une gélule n° 1

Enveloppe de la gélule : Tête : gélatine, dioxyde de titane, indigotine, érythrosine ; Corps : Gélatine, dioxyde de titane.

Forme pharmaceutique

Gélule, boîte de 20.

Classe thérapeutique

AUTRES ANALGESIQUES ET ANTIPYRETIQUES /AINS.

2/ DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques :

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : l'ibuprofène.

Il est indiqué, chez l'adulte et l'enfant de plus de 40 kg (soit environ 12 ans), dans le traitement de courte durée de la fièvre et / ou des douleurs telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et règles douloureuses.

3/ ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications :

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas de :

- Allergie au composant actif Ibuprofène ou à l'un des autres composants de la gélule
- A partir du 6ème mois de la grossesse
- Antécédents d'allergie ou d'asthme liés à la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de salicylés (aspirine)
- Ulcère gastro-duodénal en évolution
- Insuffisance rénale ou hépatique sévère ou de troubles cardiaques graves
- Lupus érythémateux disséminé (maladie du système immunitaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISE EN GARDE

Ne dépassez pas la dose maximale de 1200 mg/jour. En effet, à ces doses, ce médicament peut provoquer des inconvénients parfois graves .

Consultez votre médecin traitant avant d'utiliser Dolven, en cas de :

- Antécédents d'asthme associé à une rhinite, une sinusite chronique ou des polypes dans le nez
- Prise d'un traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire : risque hémorragique
- Antécédents digestifs : hernie hiatale, hémorragies digestives, ulcères anciens
- Insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque
- Apparition des troubles de la vue au cours du traitement

Arrêter immédiatement le traitement en cas de :

- Apparition de signes d'hémorragie gastro-intestinale : rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir. Ces signes peuvent survenir avec ou sans antécédents digestifs.
- Apparition de signes évocateurs d'allergie notamment une crise d'asthme ou un œdème de Quincke

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : **l'ibuprofène**

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou l'aspirine.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoire non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien, afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments notamment avec les anticoagulants oraux, les autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens y compris l'aspirine à fortes doses (≥ 3g/jour), le lithium, le méthotrexate à fortes doses.

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.

Grossesse et allaitement

Ne prenez pas ce médicament sans avoir demandé l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.



Grossesse

Au cours des 5 premiers mois de grossesse, Dolven ne doit être utilisé qu'après consultation d'un médecin. Il est contre-indiqué à partir du 6ème mois de grossesse.

Allaitement

Ce médicament passe dans le lait maternel. Il convient par mesure de précaution d'éviter de l'administrer chez la femme qui allaite.
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE OU DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINE

Prévenir les patients de l'apparition possible de vertiges et de troubles de la vue.

4/COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET L'ENFANT DE PLUS DE 40 KG (soit environ 12 ans)

1 gélule à renouveler si besoin au bout de 6 heures.

En cas de douleurs ou de fièvre plus intenses, 2 gélules à renouveler si besoin au bout de 6 heures.

Dans tous les cas, ne pas dépasser 6 gélules par jour (soit 1200 mg/jour).

Mode et Voie d'administration

Voie orale.

Avaler la gélule, sans la croquer, avec un grand verre d'eau, de préférence au cours des repas.

Fréquence d'administration

Espacer les prises d'au minimum 6 heures.

Les prises systématiques permettent d'éviter les pics de fièvre et de douleur.

Durée du traitement

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un autre trouble, en informer votre médecin.

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas de surdosage, arrêter le traitement et consulter rapidement un médecin.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

5/ EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

Comme tout produit actif, ce médicament peut, chez certaines personnes, entraîner des effets plus ou moins gênants :

- Réactions allergiques cutanées : éruption, démangeaisons, œdème, aggravation d'urticaire chronique, crise d'asthme, gonflement du visage et du cou avec gêne respiratoire (œdème de Quincke).

- Rarement une hémorragie gastro-intestinale peut survenir. Celle-ci est d'autant plus fréquente que la posologie utilisée est élevée et la durée de traitement prolongée.

- Effets sur le système nerveux central : exceptionnellement maux de tête accompagnés de nausées, de vomissements et de raideur de la nuque.

- Modification du bilan hépatique et de la formule sanguine.

Si vous remarquez un effet indésirable qui n'est pas mentionné dans cette notice ou que vous considérez comme grave, informez en votre médecin ou votre pharmacien.

SIGNALER A VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

A ne pas laisser à la portée des enfants.

A conserver à une température inférieure à 25°C.

7- PRESENTATION

AMM N° : 925 359 1

CECI EST MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

AP081/02

