



paxeladine

0,2 POUR CENT

1. IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

COMPOSITION

CITRATE D'OXELADINE..... 0,2 g

Excipients Parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle, jaune orangé 5 (E110), érythrosine (E127), arôme cacao, saccharose, eau purifiée.

Pour 100 ml de sirop

Une petite cuillère-mesure (2,5 ml) contient 5 mg de citrate d'oxéladine, 2,125 g de saccharose.

Une grande cuillère-mesure (5 ml) contient 10 mg de citrate d'oxéladine, 4,25 g de saccharose.

FORME PHARMACEUTIQUE

Sirop. Flacon de 125 ml avec double cuillère-mesure de 2,5 ml et 5 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTITUSSIF

(R : Système respiratoire).

2. DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué pour calmer les toux sèches et les toux d'irritation chez l'adulte et chez l'enfant de plus de 30 mois et de plus de 15 kg.

Il contient un antitussif, l'oxéladine.

3. ATTENTION!

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT?

Contre Indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie à l'un des constituants.

EN CAS DE DOUTE IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES

- Ne pas traiter par ce médicament une toux grasse. Dans ce cas, la toux est un moyen de défense naturelle nécessaire à l'évacuation des sécrétions bronchiques.
- Si la toux devient grasse, s'accompagne d'encombrement, de crachats, de fièvre, demandez l'avis de votre médecin.
- En cas de maladie chronique (au long cours) des bronches ou des poumons s'accompagnant de toux avec crachats, un avis médical est indispensable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte dans la ration journalière de la teneur en sucre : 4,25 g par grande cuillère-mesure de 5 ml et 2,125 g par petite cuillère-mesure de 2,5 ml.

- Il conviendra de ne pas associer un médicament fluidifiant des sécrétions bronchiques (expectorant, mucolytique).

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Grossesse

L'utilisation de ce médicament doit généralement être évitée pendant la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement; consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.





Allaitement

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

- Jaune orangé S (E110).

- Saccharose (4,25 g par grande cuillère-mesure de 5 ml et 2,125 g par petite cuillère-mesure de 2,5 ml).

- PHBM et PHBP

4. COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT?

POSOLOGIE

En l'absence d'efficacité, ne pas augmenter les doses au delà de ce qui est préconisé, ne pas prendre conjointement un autre antitussif, mais consulter votre médecin.

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 30 MOIS ET DE PLUS DE 15 KG.

Utiliser la double cuillère-mesure de 2,5 ml et 5 ml fournie avec ce sirop.

Enfant de 15 à 20 kg (soit 30 mois à 6 ans) : 1 petite cuillère-mesure de 2,5 ml par prise, à renouveler au bout de 4 heures en cas de besoin sans dépasser 3 ou 4 prises par jour selon le poids.

Enfant de 20 à 30 kg (soit 6 ans à 10 ans) : 1 grande cuillère-mesure de 5 ml par prise, à renouveler au bout de 4 heures en cas de besoin sans dépasser 2 à 3 prises par jour selon le poids.

Enfant de 30 à 50 kg (soit 10 ans à 15 ans) : 1 grande cuillère-mesure de 5 ml par prise, à renouveler au bout de 4 heures en cas de besoin sans dépasser 3 à 5 prises par jour selon le poids.

Adulte : 1 grande cuillère-mesure de 5 ml par prise, à renouveler au bout de 4 heures en cas de besoin sans dépasser 5 prises par jour.

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT DELIVRE DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

voie orale.

DUREE DU TRAITEMENT

Le traitement doit être court (quelques jours) et limité aux moments où survient la toux.

5. EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

SIGNEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6. CONSERVATION

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION

A conserver à une température inférieure à 25°C

AMM N° : 914.303.1

AP005 / 01

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à portée de main des enfants

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر و لكنّه ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- إقتدي بنصائح الصيدلي الذي صرفها لك.
- لاتعبد إلى المداواة ولا تزد عليها بدون إستشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية أبدا في متناول أيدي الأطفال

Laboratoires TERIAK Cheylus 1111- ZAGHOUAN.
sous licence BEAUFOUR IPSEN Pharma



BEAUFOUR IPSEN
Pharma

