

# RAPRIL®

Ramipril 5 mg et 10 mg

## 1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### Composition

Ramipril ..... 5 mg /10 mg  
Excipients (en communs) : Hypromellose, amidon prégélatinisé, cellulose microcristalline, fumarate de stéaryle sodique, q.s.p. un comprimé sécable.

### Forme pharmaceutique

Boîte de 30 et de 90 comprimés sécables.

### Classe thérapeutique

Inhibiteur de l'enzyme de conversion (IEC) non associé.

## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Indications thérapeutiques

- Traitement de l'hypertension artérielle
- Prévention cardiovasculaire
- Réduire le risque d'avoir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral
- Traitement de la néphropathie glomérulaire diabétique ou non diabétique
- Réduire le risque ou retarder l'aggravation de problèmes rénaux
- Traitement de l'insuffisance cardiaque symptomatique
- En traitement à la suite d'une crise cardiaque (infarctus du myocarde) compliquée d'insuffisance Cardiaque

## 3- ATTENTION !

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

#### Contre-indications

Ne pas prendre RAPRIL dans les cas suivants.

- Hypersensibilité antérieure connue à ce médicament.
  - Si vous avez déjà présenté des manifestations allergiques telles que bouffées de chaleur, difficultés à respirer, gonflement au niveau des mains, des pieds, des lèvres, du visage, de la glotte et/ou du larynx, après avoir pris d'autres médicaments inhibiteurs de l'enzyme de conversion.
  - Au cours des 2ème et 3ème trimestres de la grossesse (voir rubrique ci-après).
- Ce médicament ne doit généralement pas être utilisé, sauf avis contraire de votre médecin pendant le 1er trimestre de la grossesse, chez la femme qui allaite et chez l'enfant ainsi qu'en cas d'association au lithium, à l'éstramustine, aux sels de potassium ou aux diurétiques hyperkaliémiants (médicaments également prescrits dans le traitement de l'hypertension artérielle ou de l'insuffisance cardiaque).

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament AVEC PRECAUTION en cas de :

- Régime sans sel strict ou de traitement diurétique prolongé, particulièrement chez les sujets souffrant de sténose de l'artère rénale, d'insuffisance cardiaque congestive ou de cirrhose hépatique.
- Insuffisance rénale
- Insuffisance hépatique
- Chez le sujet âgé
- Chez le sujet souffrant de maladie cardiaque ischémique ou d'insuffisance circulatoire cérébrale
- Chez le sujet souffrant de diabète insulino-dépendant

Dans les suites d'infarctus du myocarde, ce traitement doit être débuté à l'hôpital sous surveillance médicale stricte

EN CAS d'intervention chirurgicale, prévenez l'anesthésiste de la prise de ce médicament

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### MISES EN GARDE SPECIALES

- Une toux sèche, une réaction allergique avec œdème de la face peuvent survenir sous traitement
- Ce médicament peut entraîner des risques de réaction allergique, chez les patients sous hémodialyse. Prévenir votre médecin si vous devez être hémodialysé.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Veuillez indiquer à votre médecin ou à votre pharmacien si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, particulièrement s'il s'agit de lithium, de l'éstramustine, de sels de potassium ou de diurétiques épargneurs de potassium (médicaments également prescrits dans le traitement de l'hypertension artérielle ou de l'insuffisance cardiaque), même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.**

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

La survenue d'une grossesse sous RAPRIL nécessite absolument de prévenir tout de suite puis de consulter le médecin chargé d'en surveiller le déroulement afin de se conformer à ses recommandations.



Prévenir également votre médecin en cas de désir de grossesse.

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée au 2ème et au 3ème trimestres de la grossesse.

Il n'existe pas de données concernant le passage dans le lait maternel. En conséquence, l'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite.

**D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.**

#### **CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES**

Les patients amenés à conduire des véhicules ou à utiliser des machines doivent être attentifs à la survenue possible de vertiges.

#### **4. COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?**

##### **Posologie**

La dose habituelle de RAPRIL varie de 2,5 à 10 mg par jour.

Cependant, votre médecin peut juger utile d'adapter cette dose à votre état personnel ; il ne faut pas la modifier de votre propre chef sans prendre son avis.

Si vous avez l'impression que l'effet de RAPRIL, est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.**

##### **Mode et Voie d'administration**

Voie orale.

Les comprimés sécables seront avalés avec une quantité suffisante de liquide (1/2 à 1 verre d'eau).

Les comprimés sécables seront avalés au moment des repas (avant, pendant ou après).

Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous soumettre à une surveillance médicale régulière ; celle-ci peut comporter des examens complémentaires (potassium et créatinine plasmatiques) ; ne les négligez pas.

#### **CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE**

En cas de surdosage ou d'intoxication accidentelle, un malaise (lié à une hypotension) peut survenir. S'allonger jambes surélevées et prévenir immédiatement le médecin.

#### **CONDUITE À TENIR AU CAS OU L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ETE OMISE**

En cas d'oubli d'une ou de plusieurs doses, il convient d'en référer à votre médecin.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

#### **5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS**

##### **Effets indésirables**

**COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :**

- Céphalée, fatigue, sensations vertigineuses, malaise, hypotension, éruption cutanée de différentes sortes, démangeaisons, nausée, vomissement, diarrhée, troubles digestifs, troubles du goût, toux sèche, spasme bronchique, fièvre, modification de certaines constantes biologiques dans le sang.

Signalez immédiatement à votre médecin si vous présentez : un gonflement des mains, des lèvres, de la langue ou une gêne dans la gorge.

**SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.**

#### **6- CONSERVATION**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas +30°C.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

##### **CECI EST MÉDICAMENT**

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS**

AP161/00



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**  
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

