



Auréomycine Spécia 3 %

Chlorhydrate de chlortétracycline

Pommade

IDENTIFICATION DU MEDICAMENT :

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :
Chlorhydrate de chlortétracycline 3.0g
Excipients : paraffine liquide, graisse de laine, vaseline pour 100 g.

FORME PHARMACEUTIQUE :

Pommade, tube de 15 g.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

ANTIBIOTHERAPIE LOCALE (D. Dermatologie).

FABRICANT :

Laboratoires TERIAK
Cheylus 1111 Zaghouan - Tunisie

EXPLOITANT ET TITULAIRE D'AMM :

Laboratoires FRILAB SA
17, rue des Pierres du Niton
CH - 1207 - Genève

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament contient un antibiotique de la famille des cyclines, il est indiqué pour traiter certaines infections cutanées à germes sensibles.

ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue aux antibiotiques de la famille des cyclines ou à l'un des autres constituants de la préparation, en particulier à la graisse de laine ou lanoline.
- infection du sein lors de l'allaitement, en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

La durée du traitement doit être limitée et ne doit pas dépasser 8 jours en raison du risque de sélection de germes résistants.

En raison du risque de photosensibilisation, éviter les expositions au soleil et aux rayonnements UV artificiels. Cette forme pommade n'est pas adaptée au traitement des lésions suintantes macérées, des plis, ni des ulcères de jambes.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT :

Ne pas appliquer ce médicament sur les seins pendant

la période d'allaitement (en cas d'infection mammaire) en raison du risque d'ingestion du produit par le nouveau-né.

D'UNE FACON GENERALE IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER AVIS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT D'UTILISER UN MEDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NECESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS :
Graisse de laine

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ? POSOLOGIE

Suivre les recommandations de votre médecin.
En général, 2 à 3 applications par jour.

MODE ET VOIES D'ADMINISTRATION : VOIE CUTANEE.

DUREE DE TRAITEMENT :

La durée du traitement ne doit pas dépasser 8 jours.
En cas de persistance des lésions, ne prolongez pas le traitement et consultez votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS (EFFETS INDESIRABLES) :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT ENTRAINER, CHEZ CERTAINES PERSONNES, DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- possibilité d'eczéma allergique de contacts,
- risque d'allergie aux rayonnements solaires et UV artificiels.

NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN. SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

CONSERVATION :

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION :

A Conserver à une température inférieure à 25°C.

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les laboratoires TERIAK
Sous licence **FRILAB** sa
Cheylus 1111 Zaghouan

FRILAB sa
Laboratoires pharmaceutiques

FAP014E/00

Aureomycine Specia 3 %

Chlortetracycline Ointment

PRODUCT INFORMATION :

QUALITATIVE/QUANTITATIVE COMPOSITION :

Chlortetracycline chlorhydrate 3 g.
Excipients: liquid paraffin, wool grease, vaseline for 100 g.

PHARMACEUTICAL FORM :

Ointment, tube of 15 g.

PHARMACO-THERAPEUTIC CLASS

LOCAL ANTIBIOTIC (D. dermatology)

MANUFACTURER :

LABORATORIES TERIAK

Cheylus 1111 Zaghouan - Tunisie

MARKETING AUTHORIZATION HOLDER

AND PHARMACEUTICAL COMPANY :

FRILAB LABORATORIES SA, 17, rue des Pierres du Niton,
CH - 1207 GENEVA

WHAT IS THIS MEDICINE USED FOR?

This product contains an antibiotic of the cyclones family. It is used in the treatment of certain cutaneous infections of sensitive germs.

WARNING!

WHEN SHOULD THIS MEDICINE NOT BE USED?

This medicine SHOULD NOT BE USED in the following cases:

- known allergy to antibiotics of the cyclones family or other constituents of the preparation, in particular wool fat or lanolin.

- breast infection when breast-feeding because of the risk of the baby ingesting the product.

IF IN DOUBT IT IS ESSENTIAL TO CONSULT YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

PRECAUTIONARY MEASURES:

The length of treatment must be limited and not exceed 8 days due to the risk of selection of resistant germs.

Because of the risk of photosensitization, avoid exposure to the sun or artificial ultra-violet light.

This ointment is not adapted to treatment of weeping or macerated lesions, hollows or ulcers of the legs.

IF IN DOUBT, DO NOT HESITATE TO CONSULT YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

MEDICAL AND OTHER INTERACTIONS :

IN ORDER TO AVOID INTERACTIONS BETWEEN THIS MEDICINE AND ANY OTHERS, YOUR DOCTOR OR PHARMACIST SHOULD BE INFORMED OF ANY OTHER TREATMENT UNDER WAY.

PREGNANCY- BREAST-FEEDING :

Do not use this medicine on the breasts if breast-feeding (in case of mammary infection) because of the risk of the baby ingesting the product.

In general, it is preferable if pregnant or breast-feeding to consult a doctor or pharmacist before taking any medicine.

LIST OF EXCIPIENTS IT IS NECESSARY TO KNOW FOR RISK-FREE USE WITH CERTAIN PATIENTS:

Wool fat.

HOW TO USE THIS OINTMENT :

DOSAGE :

Follow your doctor's recommendations.

In general, two or three applications per day.

METHOD AND PLACE OF APPLICATION :

CUTANEOUS APPLICATION.

DURATION OF TREATMENT :

The duration of treatment should not exceed 8 days.

If the lesions persist, do not prolong the treatment: consult your doctor.

UNDESIRABLE EFFECTS :

LIKE ANY OTHER ACTIVE PRODUCT, THIS MEDICINE MAY GIVE RISE TO UNDESIRABLE EFFECTS WITH CERTAIN PERSONS:

- possibility of allergic contact eczema.

- a risk of allergic reaction to sunlight or artificial ultra-violet light.

CONSULT YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ANY UNDESIRABLE EFFECTS NOT MENTIONED IN THIS NOTICE.

CONSERVATION :

DO NOT EXCEED THE DATE LIMIT FOR USE OF THIS PRODUCT GIVEN ON THE PACKAGE.

SPECIAL CONSERVATION PRECAUTION:

To be kept at a temperature under 25°C.

This is a medicine

- A medicine is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor

Keep medicines out of the reach of children



Manufactured by the Laboratories TERIAK
Under license FRILAB sa
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

FRILAB sa
Laboratoires pharmaceutiques