

ESOPREX® 10

Escitalopram 10 mg

Comprimé pelliculé sécable

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Escitalopram 10.00 mg

(sous forme d'oxalate d'escitalopram)

Excipients : cellulose microcristalline, lactose monohydraté, povidone, silice colloïdale anhydre, crospovidone, stéarate de magnésium, hypromellose, macrogol 400, dioxyde de titane q.s.p. un comprimé pelliculé sécable

Forme pharmaceutique

Comprimés pelliculés sécables, boîte de 30.

Classe pharmaco-thérapeutique

ANTIDEPRESSEUR/INHIBITEUR SELECTIF DE LA RECAPTURE DE LA SEROTONINE

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques

Esoprex est utilisé pour traiter la dépression (épisodes dépressifs majeurs) et les troubles anxieux (tels que le trouble panique avec ou sans agoraphobie, le trouble anxieux social, le trouble anxieux généralisé et les troubles obsessionnels compulsifs)

3- ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas de :

- Allergie à l'escitalopram ou à l'un des autres composants
- Associations avec certains autres médicaments antidépresseurs appelés « inhibiteurs de la monoamine oxydase non sélectifs » (IMAOs)

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Informez votre médecin de toute autre maladie ou antécédent, car il lui faudra peut-être en tenir compte

- Si vous présentez une épilepsie, le traitement doit être interrompu en cas de survenue de convulsions ou en cas d'augmentation de la fréquence des crises
- Si vous présentez une insuffisance rénale (maladie du rein) ou hépatique (maladie du foie). Votre médecin devra peut être adapter les doses de médicament
- Si vous êtes diabétique, un traitement par Esoprex peut déséquilibrer votre glycémie. Une adaptation des doses d'insuline ou d'antidiabétique oral pourra être nécessaire
- Si vous avez une quantité de sodium dans le sang diminuée
- Si vous avez tendance à saigner ou à avoir des bleus facilement
- Si vous recevez un traitement par électrochocs
- Si vous présentez une maladie coronarienne

MISE EN GARDE SPECIALES

Occasionnellement, les symptômes de la dépression ou du trouble panique peuvent comporter des pensées suicidaires ou d'auto-agressivité. Il est possible que ces symptômes continuent ou s'aggravent jusqu'à ce que l'effet complet du médicament se fasse ressentir. Ceci est plus susceptible d'apparaître si vous êtes un jeune adulte, c'est-à-dire de moins de 30 ans et si vous n'avez jamais pris de médicament anti-dépresseurs auparavant

Certains patients maniaque-dépressifs peuvent développer une phase maniaque. Elle se caractérise par des idées inhabituelles et rapidement changeantes, une joie inappropriée et une suractivité physique. Si vous ressentez cela, contactez votre médecin.

Des symptômes tels qu'une agitation ou des difficultés à rester assis ou debout tranquillement, peuvent aussi survenir durant les premières semaines du traitement. Informez immédiatement votre médecin si vous ressentez ces symptômes.

Vous pourriez parfois ne pas vous rendre compte des symptômes mentionnés ci-dessus, et par conséquent, vous pourriez trouver utile de demander à un ami ou à un parent de vous aider à observer d'éventuels signes de changement dans votre comportement.

Utilisation chez l'enfant et l'adolescent de moins de 18 ans

Esoprex ne doit habituellement pas être utilisé chez les enfants et adolescents de moins de 18 ans. Il est également important de savoir que les patients de moins de 18 ans présentent un risque accru d'effets indésirables lorsqu'ils sont traités par cette classe de médicaments

Néanmoins, il est possible que votre médecin décide de prescrire Esoprex à des patients de moins de 18 ans s'il/elle décide que c'est dans l'intérêt du patient.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Il est important d'informer votre médecin si vous prenez un des médicaments suivants :

- traitement de la dépression IMAOs non sélectifs (nialamide, iproniazide) :
- traitement de la dépression IMAO-A sélectif (moclobémide)
- traitement de la dépression (imipramine, desipramine)
- traitement des troubles maniaque-dépressifs (lithium)
- traitement de la maladie de Parkinson (sélégiline)
- traitement de certaines maladies cardiovasculaires (métoprolol, flécaïnide, propafénone)
- traitement de certaines maladies thrombo-emboliques (anticoagulants oraux)
- traitement de la migraine (sumatriptan et médicaments similaires, tramadol)
- traitement des ulcères (cimétidine à dose supérieure à 800 mg par jour, oméprazole)
- traitement des troubles de l'humeur avec des préparations à base de millepertuis (*Hypericum perforatum*)
- traitement avec le linézolide (antibiotique) ou avec la méfloquine (antipaludéen)
- traitement des psychoses (Risperidone, thioridazine, halopéridol)
- la consommation d'alcool est déconseillée au cours du traitement

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE



GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

Dites à votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de l'être

Si vous êtes enceinte, ne prenez pas Esoprex, à moins d'avoir au préalable discuté avec votre médecin des risques et des bénéfices possibles du traitement.

En cas d'utilisation pendant la grossesse, Esoprex ne devra jamais être arrêté brutalement.

Allaitement

Ne prenez pas Esoprex si vous allaitez, à moins que vous ayez discuté avec votre médecin des risques et bénéfices possibles du traitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE : Lactose

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

L'attention est appelée, chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines sur les risques d'altération du jugement ou des capacités attachés à l'emploi de ce médicament.

4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

Votre médecin adaptera progressivement la posologie. Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament est réservé à l'adulte

S'il est nécessaire de casser le comprimé, le placer sur une surface plane avec la ligne de scababilité au dessus puis exercer avec les 2 index une pression de part et d'autre de la ligne

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN

Voie et mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés peuvent être avalés en une seule prise journalière, avec un grand verre d'eau, à n'importe quel moment de la journée et indépendamment des repas

Durée du traitement

Comme avec les autres médicaments utilisés pour traiter la dépression ou les pathologies associées, l'amélioration n'est pas obtenue immédiatement. Après le début du traitement par Esoprex, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant que vous ne ressentiez une amélioration.

Il est donc important que vous suiviez exactement les consignes de votre médecin et que vous n'arrêtiez pas le traitement ou ne modifiez pas les doses sans l'avoir consulté

Continuer à prendre ESOPREX aussi longtemps que votre médecin le recommande. Si vous arrêtez votre traitement plus tôt, vos symptômes peuvent réapparaître.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Avertir immédiatement votre médecin.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Prenez la dose suivante à l'heure habituelle, ne doublez pas la dose

Risque de syndrome de sevrage

Un arrêt brutal du traitement peut être à l'origine de symptômes tels que sensations vertigineuses, nausées et maux de tête. Il est recommandé d'arrêter progressivement le traitement

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Ces effets indésirables sont généralement légers et sont surtout notés durant les deux premières semaines de traitement et s'estompent habituellement par la suite en intensité et en fréquence

- Très fréquemment : mal au cœur (nausées)
- Fréquemment : nez bouché ou écoulement nasal (sinusite) , perte ou augmentation de l'appétit, anxiété, agitation, rêves anormaux, difficultés à s'endormir, somnolence, sensations vertigineuses, bâillements, tremblements, picotement de la peau, diarrhée, constipation, vomissement, bouche sèche, transpiration excessive, douleurs musculaires et articulaires (arthralgies et myalgies), troubles sexuels (éjaculation retardée, troubles de l'érection, baisse de la libido, troubles de l'orgasme chez la femme), fatigue, fièvre, prise de poids
- Peu fréquemment : éruption urticarienne (urticaire), éruption cutanée, démangeaisons (prurit), grincement de dents, agitation, nervosité, attaques de panique, état confusionnel, troubles du sommeil, troubles du goût, malaise (syncope), pupille agrandie (mydriase), troubles visuels, bourdonnements d'oreilles (acouphènes), perte de cheveux, saignements vaginaux, perte de poids, accélération du rythme cardiaque, gonflement des bras ou des jambes, saignements de nez
- Rarement : agressivité, dépersonnalisation, hallucinations, ralentissement du rythme cardiaque, événements liés au suicide

Consultez votre médecin, si vous ressentez un des effets indésirables suivants durant votre traitement :

- Saignements anormaux (incluant saignements gastro-intestinaux), réaction allergique (gonflement de la peau, de la langue, des lèvres ou du visage ou si vous avez des difficultés à respirer), syndrome sérotoninergique rare (forte fièvre, agitation, confusion, des tremblements et contractions soudaines des muscles), difficultés à uriner, crises convulsives, un jaunissement de la peau et du blanc de l'œil signes d'un mauvais fonctionnement de foie

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE

6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants

7- PRESENTATION

AMM N° :

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Ne le prenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à portée des mains des enfants

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكنه ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك وإستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- إقتدي بنصائح الصيدلي الذي صرفها لك.
- لاتعد إلى المداواة ولاتزد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الأدوية أبدا في متناول أيدي الأطفال

AP072/00



Fabriqué par les Laboratoires TERIAK
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

