



Ce médicament contient du macrogol. De très rares manifestations allergiques (éruption, urticaire, œdème) ont été rapportées avec des produits contenant du macrogol.
EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est possible pendant l'allaitement.
D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE : Sorbitol

4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

Réservé à l'adulte et à l'enfant à partir de 8 ans.

• 1 à 2 sachets par jour à prendre de préférence en une seule prise, le matin.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

Voie et mode d'administration

Voie orale.

Le contenu des sachets doit être dissous dans un verre d'eau juste avant d'être administré

Durée du traitement

Chez l'enfant, la durée de traitement ne devra pas dépasser 3 mois.

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS : diarrhée, douleurs abdominales, ballonnements, nausées, vomissements, très rares cas de manifestations allergiques à type d'éruption, urticaire et œdème.
SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6- CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

7- PRESENTATION

AMM N° :



Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice car elle contient des informations importantes pour votre traitement

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin d'informations ou de conseils, consultez votre pharmacien.
- La persistance des symptômes, l'aggravation ou l'apparition de nouveaux troubles, imposent de prendre un avis médical.

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Macrogol 4000 (Polyéthylène glycol) 10.000 g
 Excipients : saccharine sodique, arôme orange-pamplemousse (contenant notamment du sorbitol) q.s.p un sachet-dose.

Forme pharmaceutique

Poudre pour solution buvable en sachet, boîte de 20.

Classe pharmaco-thérapeutique

LAXATIF OSMOTIQUE (A : appareil digestif et métabolisme).

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de la constipation chez l'adulte et chez l'enfant à partir de 8 ans.

3- ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Allergie au macrogol (polyéthylène glycol) ou à l'un des excipients.
- Certaines maladies du côlon et de l'intestin (rectocolite hémorragique, maladie de Crohn...)
- Suspicion d'occlusion intestinale ou de douleurs abdominales de cause indéterminée.
- Perforation digestive ou de risque de perforation digestive.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISE EN GARDE SPECIALES

PAS D'UTILISATION PROLONGEE SANS AVIS MEDICAL.

Constipation occasionnelle

Elle peut être liée à une modification récente du mode de vie. Le médicament peut être une aide en traitement court. Toute constipation récente inexplicable par le changement du mode de vie, toute constipation accompagnée de douleurs, de fièvre, de gonflement du ventre doit faire demander l'avis du médecin.

Constipation chronique (constipation de longue durée)

Elle peut être liée à deux causes :

- soit une maladie de l'intestin qui nécessite une prise en charge par le médecin,
- soit un déséquilibre de la fonction intestinale dû aux habitudes alimentaires et au mode de vie.

Le traitement comporte entre autre :

- Une augmentation des apports alimentaires en produits d'origine végétale (légumes verts, crudités, pain complet, fruits...);
- Une augmentation de la consommation d'eau de jus de fruits;
- Une augmentation des activités physiques (sport, marche...);
- Une rééducation du réflexe de défécation.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

En raison de la présence de sorbitol, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose (maladie métabolique héréditaire).

AP097/00

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à portée des mains des enfants

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكنه ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- إتباعي تعليمات الصيدلي الذي صدها لك، لا تعذر إلى المواد ولا تزيد عليها بدون استشارة الطبيب.
- لا تترك الأدوية أبدا في متناول أيدي الأطفال



Fabriqué par les Laboratoires TERIAK
 CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

