



XYLIX[®] 5 mg

Dichlorhydrate de lévocétirizine
comprimés pelliculés

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Dichlorhydrate de lévocétirizine 5 mg

Excipients : lactose monohydraté, silice colloïdale anhydre, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, macrogol 4000, dioxyde de titane, talc, alcool polyvinyle q.s.p un comprimé pelliculé.

Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé. Boîte de 15 et 30.

Classe pharmacothérapeutique

Antihistaminique à usage systémique, dérivé de la pipérazine.

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement des symptômes de la rhinite allergique (par exemple, le rhume des foins, l'allergie aux acariens) tels que éternuements, écoulement nasal clair, nez bouché, démangeaison nasale et / ou oculaire.

XYLIX 5 mg, comprimé pelliculé est également indiqué pour le traitement des symptômes de l'urticaire tels que démangeaisons et rougeurs.

3- ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la lévocétirizine ou à une substance chimiquement apparentée telle que la pipérazine, ou à l'un des autres excipients.

- si vous souffrez d'insuffisance rénale sévère ou si vous êtes hémodialysé.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISE EN GARDE SPECIALES

Ce médicament n'est pas adapté à l'enfant de moins de 6 ans.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare).

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si vous souffrez de troubles rénaux, l'intervalle entre les prises pourra être augmenté en fonction de la gravité de votre maladie. Suivez les instructions de votre médecin.

La prudence est recommandée en cas d'absorption d'alcool en même temps que ce médicament.

Chez certains patients prédisposés, l'usage concomitant de l'alcool ou d'autres déprimeurs du système nerveux central peut entraîner une réduction plus importante de la vigilance et des performances.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.





GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement que sur les conseils de votre médecin. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT.

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE : Lactose.

CONDUITE DE VÉHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Aux doses recommandées, il n'a pas été mis en évidence d'altération de la vigilance, du temps de réaction ou de la capacité à conduire au cours des tests réalisés.

Cependant somnolence, fatigue et asthénie ont été décrits chez certains patients traités par ce médicament. Par conséquent, les patients susceptibles de conduire un véhicule, ou de manipuler un outil ou une machine potentiellement dangereux, devront évaluer au préalable leurs réponses au traitement.

4- COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie

La posologie usuelle chez l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans est de 1 comprimé par jour.

Chez les patients souffrant de troubles rénaux, l'intervalle entre les prises sera augmenté

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Voie et mode d'administration

Voie orale.

Le comprimé sera avalé tel quel avec une boisson et pourra être pris au cours ou en dehors des repas

Dans tous les cas, se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

Conduite à tenir en cas de surdosage.

Un surdosage important peut entraîner : chez l'adulte, une somnolence et chez l'enfant, un état d'agitation suivi d'une somnolence.

Contactez votre médecin si vous avez pris plus de comprimés qu'il ne le fallait.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise.

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Les effets indésirables les plus fréquemment observés sont : la somnolence, la fatigue, la sécheresse de la bouche et les maux de tête. Plus rarement ont été décrites des douleurs abdominales.

D'autres effets indésirables ont été très rarement rapportés :

- Manifestations allergiques : démangeaisons, éruption cutanée, urticaire, œdème angioneurotique (œdème profond localisé au niveau du tissu sous-cutané et parfois muqueux, touchant les mains, les pieds, le visage, parfois la gorge), réaction anaphylactique (réaction allergique pouvant être généralisée)
- Essoufflement
- Nausée

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

CECI EST MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires **TERRIAK**
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

AP168/00

