



# APROZAR<sup>®</sup> 150 mg

Irbésartan

Comprimés pelliculés

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### Composition

Irbésartan ..... 150 mg  
Excipients : lactose monohydraté, silice colloïdale anhydre, cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, hypromellose, amidon de maïs prégelatinisé, stéarate de magnésium, macrogol 400, dioxyde de titane q.s.p un comprimé pelliculé.

### Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé, Boîte de 30 et 90.

### Classe pharmacothérapeutique

ANTAGONISTES DES RECEPTEURS DE L'ANGIOTENSINE II .

## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans les cas suivants :

- Traitement de l'hypertension artérielle essentielle.
- Traitement de l'atteinte rénale des patients hypertendus diabétiques de type 2.

## 3- ATTENTION !

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

#### Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas :

- Allergie à l'Irbésartan ou à l'un des excipients
- 2<sup>ème</sup> ou 3<sup>ème</sup> trimestre de grossesse
- Allaitement

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Certaines affections que vous présentez ou que vous avez présentées nécessitent des mesures de précautions particulières avant ou pendant la prise de ce médicament. C'est pourquoi avant de prendre ce médicament, il convient de prévenir votre médecin si vous présentez :

- des vomissements ou une diarrhée importante
- des problèmes rénaux
- des problèmes cardiaques

Si vous devez subir une intervention chirurgicale ou une anesthésie, avertissez votre médecin du fait que vous prenez des comprimés d'Aprozar.

Si vous avez moins de 18 ans, car ce médicament n'est pas recommandé chez ce type de patient.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare).

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.**

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

**AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.**





## GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, Aprozar ne devra pas être pris durant le 2<sup>ème</sup> et le 3<sup>ème</sup> trimestre de la grossesse ni pendant l'allaitement. Un changement pour un traitement alternatif approprié devra être effectué avant d'envisager une grossesse.

**D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.**

**LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE :** Lactose.

### CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Les patients amenés à conduire des véhicules ou à utiliser des machines doivent être attentifs à la survenue possible de vertiges.

#### 4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

##### Posologie

Le traitement débute habituellement à une dose de 150 mg une seule fois par jour. La dose peut être ultérieurement augmentée jusqu'à 300 mg en une prise par jour en fonction de la réponse sur la pression artérielle.

Chez les patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2, la dose associée est de 300 mg une fois par jour.

Cependant, votre médecin peut juger utile d'adapter cette dose à votre état personnel ; il ne faut pas la modifier de votre propre chef sans prendre son avis.

Si vous avez l'impression que l'effet d'Aprozar, est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN**

##### Voie et mode d'administration

Voie orale.

Aprozar peut être pris au cours ou en dehors des repas. Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau. Vous devez essayer de prendre votre dose quotidienne approximativement à la même heure chaque jour.

#### 5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

##### Effets indésirables

**COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :**

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez des patients ayant une pression artérielle élevée :

- Fréquemment : sensation de vertige, malaise/vomissements, fatigue et augmentation du taux plasmatique de créatine kinase.

- Peu fréquemment : accélération des battements du cœur, bouffées de chaleur, toux, diarrhées, indigestion, problèmes de performance sexuelle et douleurs dans la poitrine.

Les effets indésirables suivants ont été rapportés chez des patients ayant une pression artérielle élevée et un diabète de type 2 avec atteinte rénale :

Fréquemment : pression artérielle basse et vertiges, douleurs osseuses et musculaires ainsi qu'une diminution de l'hémoglobine.

- Peu fréquemment : augmentation du taux de potassium dans le sang.

- Occasionnelle : maux de tête, troubles du goût, bourdonnements d'oreille, douleurs articulaires et musculaires, troubles de la fonction hépatique, augmentation du taux de potassium sanguin et altération de la fonction rénale.

- Rarement : éruption, urticaire, gonflement de la face, des lèvres et/ou de la langue.

**SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.**

#### 6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

##### Précautions particulières de conservation.

A conserver à une température inférieure à 30 °C.

#### CECI EST MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

**TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS**



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**  
Cheylus 1111 - Zaghouan

AP163/00

