

LYDOL[®] 150 mg

Prégabaline

Gélules

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

1/IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition :

Prégabaline.....150 mg

Excipients : amidon prégélatinisé, talc.....q.s.p une gélule n° 2

Enveloppe de la gélule : Tête : dioxyde de titane, gélatine, indigotine, érythrosine ; Corps : dioxyde de titane, gélatine.

Forme pharmaceutique :

Gélules, Boîte de 14 et 56

Classe thérapeutique :

Antiépileptiques, autres antiépileptiques

2/ DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques :

Lydol[®] est indiqué chez l'adulte dans les cas suivants :

- Traitement des douleurs neuropathiques périphériques et centrales
- En association dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire.
- Traitement du Trouble Anxieux Généralisé (TAG).

3- ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications

Ne prenez jamais Lydol[®]

- si vous êtes allergique à la prégabaline ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- enfants et adolescents (moins de 18 ans)

PRECAUTIONS D'EMPLOI

PREVENIR votre médecin en cas de :

- réaction allergique, gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge ainsi que d'un rash cutané diffus.
- étourdissements et somnolence, pouvant augmenter la survenue de blessures accidentelles (chutes) chez les patients âgés.
- vision trouble ou une perte de la vue ou d'autres modifications de la vue, la plupart desquelles étant transitoires.
- insuffisance cardiaque.
- insuffisance rénale.
- idées autodestructrices ou suicidaires.
- problèmes gastro-intestinaux peuvent apparaître (p.ex. constipation, transit intestinal bloqué ou paralysé)
- antécédents d'alcoolisme ou de toxicomanie
- convulsions
- modification de la fonction cérébrale (encéphalopathie)

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE

Lydol peut potentialiser les effets indésirables observés avec ces médicaments, y compris l'insuffisance respiratoire et le coma. L'intensité des étourdissements, de la somnolence et de la diminution de la concentration peut être augmentée si Lydol est pris en même temps que des médicaments contenant de l'oxycodone (utilisé pour traiter la douleur), du lorazépam (utilisé pour traiter l'anxiété), de l'alcool.

Lydol peut être pris en même temps que les contraceptifs oraux.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Lydol ne doit pas être pris pendant la grossesse ou l'allaitement, sauf avis contraire de votre médecin.

Vous devez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous pensez pouvoir être enceinte.

Il n'est pas recommandé d'allaiter votre enfant pendant que vous prenez Lydol. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament pendant l'allaitement

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Lydol peut entraîner des étourdissements, de la somnolence et une diminution de la concentration. Les patients amenés à conduire des véhicules ou à utiliser des machines doivent être attentifs à la survenue possible de vertiges et de fatigue

4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle varie entre 150 mg et 600 mg par jour. C'est votre médecin qui choisira la dose adaptée à votre cas. Lydol doit être pris deux fois ou trois fois par jour, approximativement à la même heure chaque jour

Si vous êtes un patient âgé (de plus de 65 ans), vous devez prendre Lydol normalement sauf en cas de maladie des reins.

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN

Mode et Voie d'administration

Voie orale

Lydol peut être administré au moment ou en dehors des repas

Les gélules sont à avaler avec un verre d'eau

La prise simultanée de Lydol et d'alcool n'est pas recommandée.

Conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de gélules que vous n'auriez dues, prévenez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets indésirables possibles après surdosage sont : somnolence, confusion, agitation ou nervosité

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Il est important de prendre vos gélules de Lydol de façon régulière aux mêmes heures chaque jour. Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez-la dès que vous vous en rendez compte, à moins que ce ne soit le moment de prendre la dose suivante. Dans ce cas, prenez simplement la dose suivante comme convenu. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Risque de syndrome de sevrage

N'arrêtez pas votre traitement par Lydol sauf si votre médecin vous le demande. Si votre traitement est interrompu, l'arrêt doit s'effectuer de façon progressive pendant 1 semaine minimum. Après l'arrêt d'un traitement à long terme ou à court terme par Lydol, vous devez savoir que vous pouvez ressentir certains effets indésirables : troubles du sommeil, maux de tête, nausées, sensation d'anxiété, diarrhée, symptômes pseudogrippaux, convulsions, nervosité, dépression, transpiration et étourdissements. Ces symptômes peuvent apparaître plus fréquemment ou de façon plus sévère lorsque Lydol est administré pendant une période prolongée.

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

4/EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Très fréquents : étourdissements, somnolence.

Fréquents : augmentation de l'appétit, sensation d'euphorie, excitation, maux de tête, état confusionnel, désorientation, modifications de la libido, irritabilité, troubles de l'attention, maladresse, troubles de la mémoire, perte de la mémoire, tremblements, difficulté à parler, sensation de picotement, sédation, léthargie, insomnie, fatigue, maux de tête, vision floue, vertiges, troubles de l'équilibre, sécheresse de la bouche, constipation, vomissements, flatulences, troubles de l'érection, gonflement du corps y compris des extrémités, sensation d'ivresse, troubles de la marche, prise de poids.

Peu fréquents : perte d'appétit, taux faible de sucre dans le sang, nervosité, dépression, agitation, perte de mémoire, hallucinations, cauchemars, crises de panique, apathie, éjaculation retardée, engourdissement, diminution des réflexes, hyperactivité, vertiges en position debout, peau sensible, perte du goût, sensation de brûlure, tremblements lors des mouvements, diminution de la vigilance, syncope, yeux secs, yeux larmoyants, troubles du rythme du cœur, accélération du rythme cardiaque, diminution ou augmentation de la pression sanguine, bouffées de chaleur, difficulté à respirer, mal de gorge, sécheresse du nez, ballonnement, augmentation de la salive, brûlures d'estomac, engourdissement autour de la bouche, rash cutané, frissons, contractions musculaires, gonflements articulaires, douleurs articulaires, oppression dans la poitrine, modifications des résultats des tests sanguins et du foie.

Rares : modifications des battements du cœur, froideur des mains et des pieds, toux, congestion nasale, saignement nasal, ronflement, troubles de l'odorat, irritation des yeux, fièvre, inflammation du pancréas, urticaire, accumulation de liquide dans l'abdomen, douleur dans la poitrine, écoulement mammaire, croissance anormale des seins, douleurs menstruelles ou interruption des règles, taux de sucre élevé dans le sang, insuffisance rénale, diminution du volume urinaire.

Certains effets indésirables peuvent être plus fréquents, notamment la somnolence, car les patients présentant une lésion de la moelle épinière peuvent recevoir d'autres médicaments, destinés à traiter par exemple la douleur ou la spasticité, qui ont des effets indésirables similaires à ceux de la prégabaline et dont la sévérité peut être augmentée lorsque ces traitements sont pris en même temps.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE OU GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE

6- CONSERVATION

Ne pas laisser à la portée des enfants

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

A conserver dans l'emballage d'origine

Liste I

Boîte de 14 - AMM N°: 925 396 3

Boîte de 56 - AMM N°: 925 396 4

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

AP222/00