

SPASTOP® 40 mg

Bromure d'otilonium

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition :

Bromure d'otilonium 40 mg

Excipients : lactose monohydraté, copovidone, carboxyméthylamidon sodique, silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, alcool polyvinyle, dioxyde de titane, macrogol, talc q.s.p un comprimé pelliculé.

Forme pharmaceutique :

Comprimés pelliculés.

Boîte de 30 comprimés.

Classe thérapeutique :

SPASMOLYTIQUE MUSCULOTROPE.

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est un antispasmodique utilisé pour le traitement des côlons irritables et des manifestations spastico-douleuruses du canal entérique discal

3- ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas de :

- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
- En cas d'obstruction intestinale

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE

Avant de prendre ce traitement, prévenez impérativement votre médecin ou votre pharmacien

- Si vous souffrez de glaucome, d'hypertrophie, d'une sténose du pylore et pendant l'allaitement
- Ce médicament doit être utilisé avec précaution dans les cas caractérisés par une constipation fréquente et un colon atone, souvent observés chez les patients diabétiques
- Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au lactose (maladie héréditaire rare).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRE INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SOUS ORDONNANCE.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Grossesse

La prise de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse

Si vous êtes enceinte ou pensez l'être, informez votre médecin

Allaitement

L'allaitement est déconseillé durant le traitement

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT AUTRE.

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE : Ce médicament contient du lactose.

4- COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose usuelle est de 1 comprimé 2 à 3 fois par jour pour le traitement des côlons irritables et les douleurs et spasmes de l'extrémité du tractus gastro-intestinal.

Lors des procédures endoscopiques, il est recommandé de prendre 1 à 2 comprimés une heure avant l'endoscopie afin de réduire les spasmes intestinaux

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Voie et mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un demi-verre d'eau.

Conduite à tenir en cas de surdosage :

En cas de surdosage, prenez immédiatement contact avec votre médecin ou votre pharmacien.

En cas d'une prise accidentelle d'une trop forte dose, faites vomir le patient et contactez votre médecin

Conduite à tenir en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Continuez votre traitement comme avant.

Risque de syndrome de sevrage

Consultez toujours votre médecin avant d'arrêter le traitement.

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- Un peu de fatigue
- Nausées ou vomissements
- Sensation de brûlure de l'estomac
- Vertiges
- Céphalées
- Urticaire

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE OU GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

A conserver à une température ambiante (15-25°C)

Liste II

AMM N°: 925 399 1

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

AP219/000