

# XABAN® 15 mg

Rivaroxaban

Comprimé pelliculé

## Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## 1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

### Composition

Rivaroxaban ..... 15 mg  
Excipients: cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, laurylsulfate de sodium, hypromellose, stéarate de magnésium, lactose monohydraté, hypromellose 3 et 6 mPas, dioxyde de titane, macrogol 400, oxyde de fer jaune, polysorbate ..... q.s.p un comprimé pelliculé

### Forme pharmaceutique

Comprimé pelliculé

### Classe pharmacothérapeutique

HEMATOLOGIE ET HEMOSTASE

## 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est utilisé chez l'adulte pour :

- prévenir la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins de votre cerveau (accident vasculaire cérébral, AVC) et dans les autres vaisseaux sanguins de votre corps si vous souffrez d'une irrégularité du rythme cardiaque appelée fibrillation atriale non valvulaire.

- traiter les caillots sanguins qui se sont formés dans les veines de vos jambes (thrombose veineuse profonde) et dans les vaisseaux sanguins de vos poumons (embolie pulmonaire), et prévenir la réapparition de caillots sanguins dans les vaisseaux sanguins de vos jambes et/ou de vos poumons.

### 3- ATTENTION !

## DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

### Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE :

- si vous êtes allergique au rivaroxaban ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament
- si vous êtes sujet à des saignements excessifs
- si vous avez une maladie ou une prédisposition au niveau d'un organe qui augmente les risques de saignements importants (par exemple un ulcère de l'estomac, une blessure ou un saignement dans le cerveau, une intervention chirurgicale récente du cerveau ou des yeux)
- si vous prenez d'autres médicaments pour empêcher la formation de caillots sanguins (warfarine, dabigatran, apixaban ou héparine par ex.), sauf lorsque vous changez de traitement anticoagulant ou si vous avez une voie d'abord artérielle ou veineuse par laquelle de l'héparine vous est administrée pour la maintenir ouverte
- si vous présentez une maladie du foie
- si vous êtes enceinte ou si vous allaitez

Si vous êtes dans l'une de ces situations, ne prenez pas ce médicament et prévenez votre médecin.

### Avertissement et précautions

Adressez-vous à votre médecin avant de prendre ce médicament.

### Faites attention avec ce médicament

- si vous présentez un risque accru de saignement, ce qui pourrait être le cas dans les situations suivantes :
  - insuffisance rénale modérée ou sévère,
  - si vous prenez d'autres médicaments pour empêcher la formation de caillots sanguins
  - troubles hémorragiques
  - pression artérielle très élevée, non contrôlée par un traitement médicamenteux
  - maladie de l'estomac ou de l'intestin susceptible d'entraîner un saignement, ou inflammation de l'œsophage
  - anomalies au niveau des vaisseaux sanguins du fond de l'œil (rétinopathie)

- maladie des poumons avec dilatation des bronches et présence de pus (bronchectasie), ou antécédents de saignement dans les poumons

- si vous avez une valve cardiaque artificielle

- si votre médecin considère que votre pression artérielle est instable ou si un autre traitement ou une intervention chirurgicale pour enlever le caillot sanguin de vos poumons est prévu

**Si vous êtes dans l'une de ces situations, prévenez votre médecin**

**Si vous devez bénéficier d'une intervention chirurgicale :**

- il est très important que vous preniez ce médicament exactement à l'heure indiquée par votre médecin avant et après l'opération.

- Si l'intervention chirurgicale implique l'utilisation d'un cathéter ou une injection dans votre colonne vertébrale :

- il est très important que vous preniez ce médicament exactement à l'heure indiquée par votre médecin avant et après l'injection ou le retrait du cathéter

- prévenez immédiatement votre médecin si vous ressentez un engourdissement ou une faiblesse dans les jambes ou des problèmes au niveau des intestins ou de la vessie après la fin de l'anesthésie car des soins urgents sont nécessaires

### Enfants et adolescents

Ce médicament n'est pas recommandé chez les patients âgés de moins de 18 ans

### Interactions médicamenteuses et autres interactions

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris ceux obtenus sans ordonnance.

### Si vous prenez :

- certains médicaments contre les infections fongiques ou mycoses, sauf s'ils sont uniquement appliqués sur la peau ;
- certains antiviraux contre le VIH/SIDA ;
- d'autres médicaments utilisés pour fluidifier le sang ;
- des anti-inflammatoires et des anti-douleurs ;
- de la dronédarone, un médicament utilisé pour traiter les troubles de rythme cardiaque.

**Si vous êtes dans l'une de ces situations, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament.**

Si votre médecin pense que vous présentez un risque élevé de développer un ulcère de l'estomac ou de l'intestin, il peut également vous prescrire un traitement préventif contre les ulcères.

### Si vous prenez :

- certains médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie
- du millepertuis (Hypericum perforatum), un produit à base de plante utilisé pour la dépression
- de la rifampicine, un antibiotique

**Si vous êtes dans l'une de ces situations, prévenez votre médecin avant de prendre ce médicament car son effet pourrait être réduit.**

**EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN GROSSESSE ET ALLAITEMENT**

Ne prenez pas ce médicament si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Si vous devenez enceinte pendant que vous prenez ce médicament, informez-en immédiatement votre médecin qui décidera de la conduite à tenir

### CONDUITE DE VEHICULES ET UTILISATION DE MACHINES

Ce médicament peut être à l'origine de sensations

vertigineuses (effet indésirable fréquent) ou d'évanouissements (effet indésirable peu fréquent). Ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machine si vous êtes sujets à ces symptômes.

**LISTE DES EXCIPIENTS A EFFETS NOTOIRES** : Lactose  
Si votre médecin vous a informé(e) que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament

#### 4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

##### Posologie

Prévention de la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins du cerveau (AVC) et les autres vaisseaux sanguins de votre corps

La dose recommandée est d'un comprimé de 20 mg par jour. Si vous avez des problèmes rénaux, la dose peut être réduite à un comprimé de 15 mg par jour.

Traitement et prévention de réapparition des caillots sanguins formés dans les veines des jambes et dans les vaisseaux sanguins des poumons

La dose recommandée est d'un comprimé de 15 mg deux fois par jour pendant les 3 premières semaines. Après ces 3 premières semaines de traitement, la dose recommandée est d'un comprimé de 20 mg par jour.

Si vous avez des problèmes rénaux, votre médecin peut décider de réduire la dose après 3 semaines de traitement à un comprimé de 15 mg par jour si le risque de saignement est plus important que celui d'avoir un autre caillot sanguin. Avez-le(s) comprimé(s), de préférence avec de l'eau.

Ce médicament doit être pris au cours des repas.

##### À quel moment prendre ce médicament

Prenez le(s) comprimé(s) chaque jour jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter. Essayez de prendre le(s) comprimé(s) à heure fixe chaque jour pour ne pas risquer de les oublier.

Pour prévenir la formation de caillots dans les vaisseaux sanguins du cerveau (AVC) et les autres vaisseaux sanguins de votre corps : Si votre rythme cardiaque doit être ramené à la normale à l'aide d'une intervention appelée cardioversion, prenez ce médicament à l'heure indiquée par votre médecin. **Si vous avez pris plus de ce médicament que vous n'auriez dû**

Contactez immédiatement votre médecin si vous avez pris trop de comprimés. L'ingestion de trop de ce médicament augmente le risque de saignement.

##### Si vous oubliez de prendre ce médicament

- Si vous prenez un comprimé de 20 mg ou un comprimé de 15 mg une fois par jour et si vous avez oublié de prendre ce comprimé, prenez-le dès que vous vous en apercevez. Ne prenez pas plus d'un comprimé le même jour pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Prenez le comprimé suivant le lendemain puis poursuivez normalement votre traitement en prenant un comprimé chaque jour.

- Si vous prenez un comprimé de 15 mg deux fois par jour et si vous avez oublié de prendre un comprimé, prenez-le dès que vous vous en apercevez. Ne prenez pas plus de deux comprimés de 15 mg le même jour. Si vous avez oublié de prendre un comprimé, vous pouvez prendre deux comprimés de 15 mg simultanément pour atteindre la dose totale de deux comprimés (30 mg) par jour. Dès le lendemain, recommencez à prendre un comprimé de 15 mg deux fois par jour.

##### Si vous arrêtez de prendre ce médicament

N'arrêtez pas de prendre ce médicament sans en avoir d'abord parlé avec votre médecin car ce médicament prévient l'apparition de complications graves.

**DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN**

#### 5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

##### Effets indésirables

**COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :**

Certains effets indésirables peuvent être graves et demandent une attention médicale immédiate  
Comme les autres médicaments du même type (les antithrombotiques), ce médicament peut provoquer un saignement pouvant potentiellement mettre la vie du patient en danger.

Un saignement excessif peut entraîner une chute soudaine de la pression artérielle (choc). Dans certains cas, ce saignement peut ne pas être apparent

#### Effets indésirables éventuels pouvant être le signe d'un saignement:

**Prévenez immédiatement votre médecin** si vous présentez l'un des effets indésirables suivants :

- saignement abondant ou prolongé  
- sensations anormales de faiblesse, fatigue, pâleur, sensations vertigineuses, mal de tête, gonflement inexpliqué, essoufflement, douleur dans la poitrine ou angine de poitrine, qui peuvent être les signes d'un saignement.

Votre médecin pourra décider de surveiller plus étroitement votre santé ou de modifier votre traitement

##### Liste des effets indésirables éventuels :

**Fréquents**: saignement dans l'estomac ou les intestins, saignement urogénital (y compris sang dans les urines et menstruations (règles) plus abondantes), saignement de nez, saignement des gencives, saignement dans les yeux (y compris saignement au niveau du blanc de l'œil), saignement des tissus ou saignement interne (hématome, bleus), toux avec expectoration (crachat) de sang, saignement au niveau de la peau ou sous la peau, saignement suite à une intervention chirurgicale, suintement ou saignement au niveau de la plaie chirurgicale, gonflement et/ou douleurs des membres, fièvre, diminution du nombre des globules rouges dans le sang, une faiblesse ou un essoufflement, douleur à l'estomac, indigestion, envie de vomir ou vomissements, constipation, diarrhée, pression artérielle basse, diminution de la vivacité, mal de tête, sensations vertigineuses, éruption cutanée, démangeaisons, altération du fonctionnement des reins, possible élévation de certaines enzymes du foie lors des analyses de sang.

**Peu fréquents**: saignement dans le cerveau ou à l'intérieur du crâne, saignement au niveau d'une articulation entraînant douleur et gonflement, évanouissement, malaise général, bouche sèche, accélération des battements cardiaques, réactions allergiques, urticaire, altération du fonctionnement du foie, possible élévation de la bilirubine, de certaines enzymes du pancréas ou du foie ou du nombre de plaquettes lors des analyses de sang.

**Rares**: saignement dans un muscle, gonflement localisé, coloration jaune de la peau et des yeux, accumulation de sang dans l'aine en complication d'une intervention cardiaque consistant à introduire un cathéter au niveau de l'artère de la jambe (pseudo-anévrisme)

**Fréquence indéterminée** : augmentation de la pression dans les muscles des jambes ou des bras après un saignement, entraînant des douleurs, des gonflements, une altération des sensations, un engourdissement ou une paralysie, insuffisance rénale suite à une hémorragie sévère

**Les effets indésirables suivants ont été également signalés**: oedème de Quincke et oedème allergique (gonflement du visage, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge), cholestase, hépatite dont lésion hépatocellulaire, thrombopénie

**SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE**

#### 6- CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

#### 7- PRESENTATION

Boîte de 42 - ANM N° :

Liste I – Tableau A

#### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS**



Fabriqués par les Laboratoires TERIAK  
Cheylus 1111 - Zaghouan

AP274/01