

Décontracty l° 500 mg

MEPHENESINE

COMPRIMES ENROBES

Que contient décontractyl 500 mg?

MEPHENESINE 500,00 mg

Excipient : Amidon de maïs, carboxyméthylamidon sodique type A, carbonate de calcium, gel de silice, talc, stéarate de magnésium, opadray rouge OY-35056, opadray blanc Y-17000.

Pour un comprimé enrobé. Boîte de 24.

A quelle classe pharmaco-thérapeutique appartient décontractyl 500 mg ?

MYORELAXANT A ACTION CENTRALE (M: appareil locomoteur).



Ce médicament est indiqué, chez l'adulte (plus de 15 ans), en traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses.

Quelles sont les contre-indications de décontractyl 500 mg ?

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants : - antécédent d'allergie à l'un des composants,

- porphyrie (maladie héréditaire).

Ce médicament NE DOIT GENERALEMENT PAS ETRE UTILISE en cas de grossesse ou d'allaitement.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.



EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

INTERACTION MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE - ALLAITEMENT

Ce médicament est déconseillé pendant la grossesse.

Si vous découvrez au cours du traitement que vous êtes enceinte, arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

Par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant l'allaitement.



CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

Risque rare de somnolence.

Comment utiliser décontractyl 500 mg?

Posologie : 1 à 2 comprimés par prise, 3 fois par jour. Mode et voie d'administration : Voie orale. Avaler les comprimés avec un peu d'eau.

Durée d'un traitement avec décontractyl 500 mg?

EN CAS DE PERSISTANCE DES TROUBLES AU DELA DE OUELOUES IOURS. NE PAS AUGMENTER LES DOSES ET CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.

En cas d'ingestion accidentelle, prévenir immédiatement un médecin.

Effets non souhaités et génants de décontractyl 500 mg

COMME TOUT MEDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS:

Exceptionnellement : Allergie grave avec baisse de tension artérielle, Rarement : Nausées, vomissements, somnolence, éruption cutanée allergique. EN PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET A SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR.

Ce médicament doit être conservé à l'abri de l'humidité.

AMM n°: 925 328 2

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indications.
- N'arrêtez pas de votre propre intiative le traitement durant la période prescrite. - Ne le reprenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires TERIAK CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN Sous-licence Sanofi Synthelabo - otc - France







