



AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN MÊME S'IL S'AGIT D'UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament au cours de la grossesse et de l'allaitement

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MÉDICAMENT

#### CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

La prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, une somnolence, de la fatigue et des troubles visuels  
Dans ces cas, la capacité à réagir peut être diminuée

#### LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE : Saccharose

#### 4- COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

##### Posologie

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien : 1 gélule à 15 mg par jour.
- Traitement d'entretien et prévention des récurrences des œsophagites par reflux gastro-œsophagien : 1 gélule à 15 mg par jour et, si nécessaire, 30 mg par jour.
- Traitement d'entretien des ulcères duodénaux : 1 gélule à 15 mg par jour.
- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque : 1 gélule à 15 mg par jour.

#### Voie et mode d'administration

Voie orale.

Avalez la gélule avec un verre d'eau. Si vous trouvez que les gélules sont difficiles à avaler, votre médecin peut vous conseiller d'autres façons de prendre le médicament. N'écrasez ou ne croquez pas les gélules ou leur contenu car cela altérerait leurs propriétés.

Si vous prenez IPPZOR une fois par jour, essayez de le prendre à la même heure chaque jour. Vous pouvez obtenir de meilleurs résultats si vous prenez IPPZOR dès que vous vous levez le matin.  
Rebouchez soigneusement le flacon après chaque prise

#### 5- EFFETS NON SOUHAITÉS ET GENANTS

##### Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Ont été rapportés :

- Fréquemment : maux de tête, étourdissement, diarrhées, constipation, douleurs abdominales, vomissements, nausées, flatulences, sécheresse de la bouche ou de la gorge, urticaire, prurit, rash, perturbation du bilan hépatique, fatigue
  - Peu fréquemment : dépression, douleur musculaire, articulaire, œdème, modification de la formule sanguine
  - Rarement : anémie, insomnie, hallucination, confusion, vertiges, parosmésie, somnolence, tremblements, troubles visuels, glossite, candidose œsophagienne, altération du goût, pancréatite, hépatite, ictère, chute des cheveux, érythème polymorphe, photosensibilité, problèmes rénaux, gynécomastie, fièvre, œdème de Quincke, anorexie, impuissance
- SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GENANT QUI LE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE**

#### 6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

##### Précautions particulières de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

Conserver le flacon soigneusement fermé dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité

#### 7- PRÉSENTATION

- Boîte de 15 gélules AMM N° : 925 352 1
- Boîte de 7 gélules AMM N° :
- Boîte de 28 gélules AMM N° : 925 352 4

CECI EST UN MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres, un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à portée des mains des enfants

این هذا دواء

- الدواء مستحضر و لكنه ليس كغيره من المستحضرات.

- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستعماله خلافا للتعليمات يضر صحتك.

- إتباعي تعليمات الصيدلي الذي يمسرها لك، - لا تعمد إلى تناول الدواء و أكثر عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الايدي ابناء ابيدي مشاوي ايدي الاطفال

AP074/02

# IPPZOR® 15 mg

Lansoprazole

Gélules gastro-résistantes

**Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

Elle contient des informations importantes sur votre traitement

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire

#### 1- IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

##### Composition

Lansoprazole.....15 mg

Excipients : saccharose, laurylsulfate de sodium, meglumine, mannitol, hypromellose, macrogol 6000, talc, polysorbate 80, dioxyde de titane, copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (Eudragit L30 D-55) ..... q.s.p. une gélule  
Enveloppe de la gélule : Tête : gélatine, dioxyde de titane, érythrosine, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge ; Corps : gélatine, dioxyde de titane, indigoine

##### Forme pharmaceutique

Microgranules gastro-résistants en gélule

Boîte de 7, de 15 et de 28 gélules.

##### Classe pharmaco-thérapeutique

INHIBITEURS DE LA POMPE À PROTONS

(A : appareil digestif et métabolisme)

#### 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

##### Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans les cas suivants :

- Traitement symptomatique du reflux gastro-œsophagien, associé ou non à une œsophagite.
- Traitement d'entretien et prévention des récurrences des œsophagites par reflux gastro-œsophagien.
- Prévention des rechutes des ulcères duodénaux

- Traitement préventif des lésions gastroduodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens chez les patients à risque (notamment âge supérieur à 65 ans, antécédents d'ulcère gastroduodénal) pour lesquels un traitement anti-inflammatoire est indispensable.

#### 3- ATTENTION !

##### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

##### Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas de :

- D'allergie au lansoprazole ou à l'un des excipients.

Ce médicament ne doit pas être administré avec de l'atazanavir

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

#### MISES EN GARDE SPÉCIALES

- Avant tout traitement par Lansoprazole, il convient d'exclure une éventuelle malignité gastrique lors du traitement de l'ulcère gastrique

- Signaler à votre médecin, si vous êtes atteint d'une maladie hépatique sévère ou modérée

- Le traitement peut conduire à une légère augmentation du risque d'infections gastro-intestinales due à une diminution de l'acidité gastrique

- L'acidité gastrique réduite pendant le traitement doit être réalisée chez les patients soumis au traitement d'entretien pendant plus d'un an

- La survenue d'une diarrhée persistante au cours des premiers mois de traitement peut évoquer une colite (voir Effets indésirables) et ainsi conduire à interrompre le traitement

- En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrose-isomaltase.

#### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec PRECAUTION en cas d'affections chroniques du foie

L'utilisation d'IPPZOR n'est pas recommandée chez l'enfant

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN**

#### INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin, IPPZOR peut modifier les propriétés de certains médicaments.

Pour de meilleurs résultats, prenez IPPZOR au moins 30 minutes avant les repas.



Laboratoires **TERIAK**  
Cheyhus 1111 - Zaghouan