

Lexomil® comprimés-Baguette

Bromazépam

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Ce médicament est un anxiolytique, il appartient à la famille chimique des benzodiazépines.

Ce médicament est préconisé dans certains états d'anxiété.

CONTRE-INDICATIONS

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- allergie connue aux benzodiazépines
- insuffisance respiratoire

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISE EN GARDE

L'anxiété peut avoir des causes variées, n'entraînant pas systématiquement la prise d'un médicament.

Tout traitement par les benzodiazépines peut entraîner un état de dépendance physique et psychique. Celle-ci est favorisée par la durée du traitement la dose, l'association à d'autres anxiolytiques ou hypnotiques ou à l'alcool. Cet état peut s'accompagner à l'arrêt du traitement d'un phénomène de sevrage (insomnie, maux de tête, douleurs musculaires, anxiété, irritabilité, agitation). L'arrêt progressif du traitement permet d'éviter ces effets.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Prévenir votre médecin en cas de : maladie du foie, des reins ou des muscles (myasthénie), en cas de grossesse, d'allaitement.

- Ne pas arrêter brutalement le traitement.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Alcool : la prise de boissons alcoolisées pendant la durée du traitement est déconseillée.

EFFETS SUR LA CAPACITÉ DE CONDUIRE DES VEHICULES OU D'UTILISER DES MACHINES

Les risques de somnolence, de diminution des réflexes peuvent rendre dangereuse la conduite automobile ou l'utilisation de machines.

AUTRES EFFETS POSSIBLES DU MEDICAMENT

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

- somnolence, troubles de la mémoire
- éruptions cutanées, vertiges

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

- Chez l'adulte, la posologie usuelle est de 1 comprimé-Baguette par jour.

réparti le plus souvent de la manière suivante :

- 1/4 de comprimé-Baguette le matin
- 1/4 de comprimé-Baguette le midi
- 1/2 comprimé-Baguette le soir

- Chez le sujet âgé, il est recommandé de la diminuer

Pour une bonne utilisation de ce médicament, il est indispensable de vous

soumettre à une surveillance médicale régulière. La durée du traitement est habituellement de quelques jours à quelques semaines.

La posologie est variable d'un sujet à l'autre. Elle ne dépend pas de la gravité des troubles mais des réactions de chacun. Seul le médecin peut la définir.

Arrêt du traitement :

Dans certains cas, l'arrêt du traitement doit être très progressif avec diminution des doses par paliers de plusieurs jours.

Un arrêt brutal après prise prolongée peut entraîner l'apparition d'irritabilité et de mauvais sommeil durant quelques jours. Ces troubles régressent spontanément. IL EST IMPERATIF DE SE CONFORMER A L'ORDONNANCE ET DE NE PAS PROLONGER CE TRAITEMENT AU-DELA DE LA PRESCRIPTION DU MEDECIN.

CONDITION DE DELIVRANCE

CE MEDICAMENT EST INSCRIT SUR LA LISTE I

LA DUREE DE PRESCRIPTION EST LIMITEE A 12 SEMAINES

CE MEDICAMENT VOUS A ETE PERSONNELLEMENT PRESCRIT DANS UNE SITUATION PRECISE :

- IL PEUT NE PAS ETRE ADAPTE A UN AUTRE CAS
- NE PAS LE REUTILISER SANS AVIS MEDICAL
- NE PAS LE CONSEILLER A UNE AUTRE PERSONNE

DUREE DE STABILITE

NE PAS DEPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION MARQUEE SUR L'EMBALLAGE

PRESENTATION

Comprimés-Baguettes quadriscabables dosés à 6 mg de bromazépam
Etui de 30. AMM n° 925 306 1

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non pas comme les autres
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit
- Suivez le conseil de votre pharmacien
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses indications et ses contre-indications
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin

**NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS
A LA PORTEE DES ENFANS**

Laboratoire **TERIAK**

29, Rue 8603 Z.I. La Chargaia I 2035 Tunis Carthage

Usine : CHEYLUS 1111



Un pilulier se trouve inséré au fond du tube, du côté apposé au bouchon blanc

Séparable du tube, ce pilulier peut ainsi être emporté avec soi.

Il a été réalisé pour :

- y placer la dose quotidienne prescrite par le médecin traitant
- contrôler soi-même la quantité déjà prise dans la journée.

Veiller à ne pas laisser à portée des enfants.