



Thiocolchicoside
miOREL®
4 mg GELULE

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

Elle contient des informations importantes sur votre traitement.

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

1) IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

a) DENOMINATION

miOREL® 4 mg, gélule

b) COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITAVE

Thiocolchicoside 4 mg

Pour une gélule n°2.

Excipients : lactose, amidon de maïs, stéarate de magnésium.

Enveloppe de la gélule : gélatine

c) FORME PHARMACEUTIQUE

Gélule.

d) CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE

MYORELAXANT (M : Muscle et squelette)

2) DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

(INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Ce médicament est un myorelaxant. Il est préconisé chez l'adulte (plus de 15 ans), dans le traitement d'appoint des contractures musculaires douloureuses.

3) ATTENTION!

a) DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

(CONTRE-INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ en cas :

- d'antécédents d'allergie au thiocolchicoside ou à l'un des constituants du produit
- d'allaitement

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ pendant le premier trimestre de la grossesse.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

b) MISES EN GARDE SPECIALES

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares)

c) PRECAUTIONS D'EMPLOI

En cas de diarrhée, prévenez votre médecin qui pourra éventuellement réajuster la posologie.

En cas de douleurs d'estomac, prévenez votre médecin.

d) INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

e) GROSSESSE - ALLAITEMENT

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant le premier trimestre de la grossesse. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin : lui seul pourra adapter le traitement à votre état.





Le médicament est contre-indiqué en cas d'allaitement.

D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT, AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT, DE TOUJOURS DEMANDER AVIS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE UN MÉDICAMENT.

f) LISTE DES EXCIPIENTS DONT LA CONNAISSANCE EST NÉCESSAIRE POUR UNE UTILISATION SANS RISQUE CHEZ CERTAINS PATIENTS

Lactose

4) COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

a) POSOLOGIE

Réservé à l'adulte (plus de 15 ans)

La posologie habituelle est de 4 gélules par jour, en 2 prises.

DANS TOUS LES CAS, CONFORMEZ-VOUS À LA PRESCRIPTION DE VOTRE MÉDECIN.

b) MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

Avaler les gélules avec un verre d'eau au cours des repas.

c) FREQUENCE ET MOMENT AUXQUELS LE MÉDICAMENT DOIT ÊTRE ADMINISTRÉ

CONFORMEZ-VOUS STRICTEMENT À LA PRESCRIPTION DE VOTRE MÉDECIN.

d) DUREE DU TRAITEMENT

CONFORMEZ-VOUS STRICTEMENT À LA PRESCRIPTION DE VOTRE MÉDECIN.

e) CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE

EN CAS DE PRISE D'UNE DOSE EXCESSIVE, APPELEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

f) CONDUITE À TENIR AU CAS OÙ L'ADMINISTRATION D'UNE OU PLUSIEURS DOSES A ÉTÉ OMISE

Prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oubliée de prendre.

5) EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS

COMME TOUT MÉDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES, ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- rares troubles digestifs : diarrhée, douleurs d'estomac (voir Précautions d'emploi),
- rares manifestations allergiques cutanées.

NE PAS HESITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN ET À SIGNALER TOUT EFFET NON SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.

6) CONSERVATION

a) NE PAS DÉPASSER LA DATE LIMITE D'UTILISATION FIGURANT SUR LE CONDITIONNEMENT EXTERIEUR

b) PRECAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver à une température inférieure à 25°C.

7) PRÉSENTATION

Boîte de 12 gélules et boîte de 24.

CECI EST MÉDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
- Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS



Fabriqué par les Laboratoires TIERIAK
Sous licence Daiichi Sankyo France
CHEYLUS 1111 - Zaghoutan



AP148/01

