

# AMLODIS<sup>®</sup> 5

## Amlodipine 5 mg

### 1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

#### Composition

Amlodipine ..... 5 mg

(sous forme d'amlodipine bésylate)

Excipients : cellulose microcristalline, hydrogénophosphate de calcium anhydre, carboxyméthylamidon sodique, stéarate de magnésium Q.S.P. un comprimé

#### Forme pharmaceutique

Boîte de 30, de 60 et de 90, comprimés

#### Classe thérapeutique

Inhibiteur calcique sélectif à effet vasculaire

(C : Système cardiovasculaire)

### 2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

#### Indications thérapeutiques

- Hypertension artérielle
- Traitement préventif des crises d'angine de poitrine : angor d'effort, angor spontané (dont l'angor de Prinzmetal)

### 3- ATTENTION !

#### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT

##### Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :

- Hypersensibilité connue à l'amlodipine ou à un autre inhibiteur calciques de la classe des dihydropyridines
- Traitement concomitant par dantrolène (en perfusion), sauf avis contraire de votre médecin.

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Il convient d'administrer ce produit avec précaution chez les insuffisants hépatiques

#### MISES EN GARDE SPECIALES

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez l'enfant
  - En cas de survenue de signes cliniques (asthénie, anorexie, nausées persistantes), il est recommandé de doser les enzymes hépatiques. En cas d'élévation des taux et, à plus forte raison en cas d'ictère, le traitement doit être interrompu.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

#### CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINE

En début de traitement, une prudence particulière devra être observée chez les conducteurs de véhicules automobiles et les utilisateurs de machines, en raison du risque de sensation de vertige

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS. IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE

#### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

L'utilisation de ce médicament est déconseillée pendant la grossesse et l'allaitement. Prévenir votre médecin si vous êtes enceinte ou susceptible de l'être ou si vous désirez allaiter votre enfant.

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT

### 4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

#### Posologie

La posologie doit être réglée en fonction de la tolérance du patient et de sa réponse au traitement.

La posologie recommandée en Amlodis 5 est de 1 comprimé à 5 mg une fois par jour.

Au besoin, elle pourra être augmentée jusqu'à la dose maximale de 10 mg une fois par jour.

DANS TOUTS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN



## Voie et mode d'administration

Voie orale

Les comprimés sont à avaler avec un peu d'eau, en une seule prise.

### Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas de prise excessive, ce médicament peut provoquer une hypotension importante, prévenir immédiatement votre médecin

### Conduite à tenir au cas ou l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Prévenir votre médecin ou votre pharmacien.

## 5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

### Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Les effets indésirables le plus fréquemment notés sont : maux de tête, œdème (gonflement) des jambes, rougeurs ou sensation de chaleur de la face. Ces effets apparaissent au début du traitement et sont généralement transitoires.

Plus rarement :

- Effets cardiaques : accélération du rythme cardiaque modérée, palpitations
- Effets cutanéomuqueux : réactions allergiques (démangeaison, brusque gonflement du visage ou du cou, réactions cutanées diverses)
- Effets neuro-psychiques : Fatigue, sensation de vertige, trouble du sommeil, fourmillement dans les extrémités, tremblements, troubles visuels, troubles dépressifs
- Effets digestifs : douleurs abdominales, troubles du goût, digestion difficile, perte de l'appétit, nausées, troubles du transit intestinal
- Effets neuromusculaires : crampes musculaires, douleurs des muscles, douleurs articulaires
- Effets hépatiques : jaunisse, modification biologique d'origine hépatique Exceptionnellement atteinte assez sévère du foie (effets réversibles à l'arrêt du traitement)
- Effets pulmonaires : Difficulté respiratoire
- Effets génito-urinaires : augmentation de la fréquence d'émission des urines, impuissance, développement des seins chez l'homme

Comme avec les autres dihydropyridines, un élargissement gingival a été rapporté chez des patients présentant une gingivite/parodontite prononcée. Cet effet peut être évité ou disparaître avec une bonne hygiène dentaire.

Les effets indésirables, tels que douleurs angineuses dans la région thoracique pouvant survenir, très rarement, après la prise du médicament, ou palpitations, il convient de prévenir immédiatement votre médecin.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE

## 6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

## 7- PRESENTATION

Boîte de 30 : AMM N° : 925 313 1

Boîte de 60 : AMM N° : 925 313 2

Boîte de 90 : AMM N° : 925 313 3

### CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais pas comme les autres
- Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Respecter rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit
- Suivez le conseil de votre pharmacien
- Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament ses indications et ses contre-indications
- N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite
- Ne le reprenez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin

**NE LAISSEZ JAMAIS LES MEDICAMENTS  
A LA PORTEE DES ENFANTS**



Fabriqué par les Laboratoires **TERIAK**  
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

AP019/03

