

Autres : lithium, anticoagulants, méthotrexate, certains diurétiques et antihypertenseurs, Zidovudine, Kayexalate.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN MÊME S'IL S'AGIT D'UN MÉDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE.

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE : Parahydroxybenzoate de méthyle – saccharose – sorbitol.

4/COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Posologie

La posologie dépend du poids de l'enfant.

Là dose quotidienne recommandée d'acide méfénamique est d'environ 15 mg/kg/jour, à répartir en 3 prises par jour.

Mode et Voie d'administration

Voie orale. Il faut bien agiter le flacon avant emploi.

Mefenal est à prendre au moment des repas.

Ce médicament s'administre au moyen d'une seringue-doseuse pour administration orale fournie (graduée en kg de poids corporel) qui délivre une dose de 5 mg/kg par prise de suspension pédiatrique.

Mode d'emploi de la seringue doseuse

La dose à administrer pour une prise est obtenue en remplissant la seringue doseuse jusqu'à la graduation correspondante au poids de l'enfant.

Durée du traitement

Si la douleur persiste plus de 5 jours, ou si elles s'aggravent ou en cas de survenue d'un autre trouble, en informer votre médecin.

Conduite à tenir en cas de surdosage

En cas de surdosage, arrêter le traitement et consulter rapidement un médecin.

Conduite à tenir au cas où l'administration d'une ou plusieurs doses a été omise

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

5/ EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

Comme tous les médicaments, Mefenal peut entraîner des effets indésirables :

- Effets gastro-intestinaux : sensation de brûlure, maux de ventre, nausées, vomissements, troubles du transit, ulcérations gastro-intestinales accompagnées parfois de saignement ou d'une perforation. Ces troubles sont d'autant plus marqués que la posologie utilisée est élevée et la durée du traitement prolongée. Leur fréquence diminue avec la prise de Mefenal au moment des repas. Ces effets indésirables peuvent être évités par la prise de la plus petite dose efficace le moins longtemps possible.

Possibilité de troubles digestifs et de diarrhées en raison de la présence de sorbitol.

- Réactions d'hypersensibilité : urticaire, démangeaison, crise d'asthme, gonflement du visage. Si un de ces symptômes se manifeste ce qui peut se produire dès la première utilisation, il faut consulter immédiatement un médecin.

- Exceptionnelles complications infectieuses de la peau en cas de varicelle.

- Effets sur le système nerveux central : exceptionnellement vertiges et céphalées.

SIGNALER À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE

6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

7- PRESENTATION

AMM N° : 925 354 1

Ceci est un médicament

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Ne le reprendre pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à portée des mains des enfants

إن هذا دواء

- الدواء مستحضر ولكنه ليس كبيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا للتعليمات يعرضك للخطر.
- اتقى بمتابعة الطبيب الذي صرفها لك.
- لا تلجأ إلى المواد ولا تزيد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الادوية ايها ابي في متناول ايدي الاطفال

FAP029/02

MEFENAL®

Suspension buvable pédiatrique

Acide méfénamique 1%

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament

Mefenal suspension pédiatrique peut être obtenu sans prescription médicale. Vous devez néanmoins l'utiliser avec le plus grand soin pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire
- Si vous avez besoin d'informations ou de conseils, consultez votre pharmacien
- Consultez votre médecin si les symptômes s'aggravent ou ne s'améliorent pas au bout de quelques jours

1/IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT

Composition

Acide méfénamique 1 g
Excipients : saccharose, sorbitol cristallisable, glycérol, Avicel RC591, polysorbate 80, parahydroxybenzoate de méthyle, arôme banane, huile essentielle partiellement démentholée de mentha avensis, eau purifiée q.s.p. 100 ml.

Forme pharmaceutique

Suspension buvable pédiatrique, flacon de 150 ml.

Classe thérapeutique

ANTI-INFLAMMATOIRE, ANALGESIQUE NON STEROÏDIEN

2/ DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Indications thérapeutiques :

Ce médicament est indiqué :

- Chez l'enfant à partir de 12 ans dans le traitement symptomatique des affections douloureuses telles que douleurs dentaires et algies d'origine diverses.
- Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 12 ans dans les pathologies inflammatoires.

3/ ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

Contre-indications :

- allergie au composant actif Acide méfénamique ou à l'un des autres composants du médicament
 - antécédents d'allergies à l'aspirine ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris les inhibiteurs de la COX-2.
 - Ulcère gastro-intestinal ou de saignements gastro-intestinaux en évolution.
 - affection intestinale inflammatoire telle que maladie de Crohn ou colite ulcéreuse.
 - insuffisance rénale ou hépatique grave ou troubles cardiaques graves.
 - Nourrissons et enfants de moins de 12 ans sauf dans les pathologies inflammatoires.
- EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE

PREVENIR VOTRE MÉDECIN en cas :

- d'antécédents d'asthme associé à une rhinite chronique, une sinusite chronique ou des polyypes dans le nez notamment chez certains sujets allergiques à l'aspirine ou à un anti-inflammatoire non stéroïdien. L'administration de ce médicament peut dans ce cas entraîner une crise d'asthme.
 - de traitement anticoagulant concomitant, ce médicament pouvant entraîner des manifestations gastro-intestinales graves.
 - de maladie du cœur, du foie ou du rein.
 - de varicelle. Il est prudent d'éviter l'utilisation de ce médicament.
 - d'antécédents digestifs (hernie hiatale, hémorragies digestives, ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien...).
- En cas de diabète ou de régime pauvre en sucre, tenir compte de la teneur en saccharose.

INTERROMPRE IMMÉDIATEMENT LE TRAITEMENT en cas :

- d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration des selles en noir).
- éruption cutanée, de crise d'asthme, de gonflement du visage ou du cou ou d'autres signes d'allergie.
- de diarrhée.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Informez votre médecin ou votre pharmacien si votre enfant utilise ou a utilisé récemment d'autres médicaments.

Notamment : les glucocorticoïdes et autres médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens y compris l'aspirine et ses dérivés.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine



Fabriqué par les Laboratoires TERIAK
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN